

Septiembre 10: Día Mundial para la Prevención del Suicidio


Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la Salud

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO VALLE DEL CAUCA

2020

En este día se fomentan los compromisos y medidas prácticas para prevenir el suicidio. Cada año se suicidan casi un millón de personas,

lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100 000, o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60%; se considera una de las tres primeras causas de defunción



entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; estas cifras no incluyen los tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes.

La prevención del suicidio no se ha abordado de forma adecuada debido a la falta de sensibilización y al tabú que lo rodea; requiere la intervención de sectores distintos al de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial. Por otra parte, el coronavirus está afectando la salud, especialmente la de trabajadores de la salud. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión. La OPS advirtió que la pandemia por COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo que instó a hablar del tema en forma abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenirlo.

La OPS está trabajando con los países de la Región para fortalecer los sistemas de salud que pueden estar faltos de recursos o sobrecargados debido a la pandemia, a fin de hacer frente al posible aumento de los trastornos de salud mental y mantener la continuidad de la atención de las personas. Así mismo recomienda incorporar el apoyo de salud mental y psicosocial en los planes y esfuerzos de respuesta al COVID-19.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA



DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA



@SECSALUDVALLE



/SECSALUDVALLE



@SECSALUDVALLE

Contenido

| | |
|--|----|
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2 |
| ZONOSIS | 5 |
| ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES | 9 |
| ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y/O AGUA | 12 |
| INMUNOPREVENIBLES | 15 |
| INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD | 24 |
| MICOBACTERIAS | 26 |
| ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | 29 |
| ENFERMEDADES CRÓNICAS | 33 |
| VIGILANCIA NUTRICIONAL | 37 |
| MORTALIDAD INFANTIL INTEGRADA | 40 |
| MATERNIDAD SEGURA | 42 |
| SALUD MENTAL | 46 |
| FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL | 48 |
| POBLACIONES ESPECIALES | 49 |

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN


➤ SIVIGILA

Cumplimiento en la notificación

La notificación recibida por el Departamento del Valle del Cauca corresponde al resultado del procesamiento y análisis de los datos recibidos para la semana 37 del 2020; el reporte de las unidades notificadoras municipales (UNM) a nivel departamental fue de 100% (41 de 41 municipios; Meta 98%). Esta información excluye el Distrito de Buenaventura. Lo anterior, quiere decir que en este proceso se notificó al menos un evento EISP.

39 municipios cumplieron con el envío en la hora establecida (95%), meta estimada para UNM: 98%; (Mapa 1).

Mapa 1. Cumplimiento de la notificación semanal UNMD, Valle del Cauca, semana Epidemiológica 37.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

El cumplimiento a nivel departamental de las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) en esta semana fue de 99% (372 de 376). 40 municipios cumplieron con la meta 90% para este nivel. (Mapa 2).

Mapa 2. Cumplimiento de la notificación semanal UPGD, Valle del Cauca, semana Epidemiológica 37.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Instituciones en silencio epidemiológico

Se da cuando una UPGD no se notifica RON casos en la semana, ni hace la notificación negativa. Esta situación constituye una alerta en el sistema. A la semana 37, 1% (4) de las UPGD se encuentran en silencio epidemiológico, como se detalla en la tabla 01.

Tabla 01. Unidades primarias generadoras de datos en la semana epidemiológica 36, en el departamento de Valle del Cauca.

| nom mun | cod pre | cod sub | raz soc |
|------------|------------|---------|--------------------------------|
| Buga | 7611103406 | 03 | Urgencias Médicas Ltda |
| Candelaria | 7613007049 | 07 | Viva 1a Ips Sa |
| Dagua | 7623307766 | 01 | Héctor Franklin Botina Paredes |
| Tuluá | 7683404064 | 41 | Cosmitet Ltda |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ Estadísticas vitales

Nacimientos

Según la base de datos de la plataforma RUAF-ND, hasta la semana epidemiológica (SE) 37 hubo 30.534 certificados de nacimiento, de los cuales 94,21% (28.767) fueron residentes del departamento del Valle del Cauca; de ellos a su vez, 93,70% (28.601) fueron registrados en Cali, Tuluá, Palmira, Buga y Cartago. (Tabla 2).

De total de certificados 2,01 % (611) no fueron hemoclasificados, siendo nacimientos institucionales y la mayoría provenientes de los municipios de Cali (486), Tuluá (66), Pradera (17), Jamundí (6) y Obando (5). Del total de ingresados a la plataforma, 1.246 (4,08%) no fueron confirmados.

Algunas características de interés

- ✓ **Edad promedio de las madres:** 26 años (Rango 13 - 53).
- ✓ **Promedio de controles prenatales:** 7 (Rango 0 a 19); 11,58% tuvieron menos de 4 controles prenatales.
- ✓ **Tipo de parto:** Cesárea 37,13%; Espontáneos 62,76%; y Instrumentado 0,10 e ignorado 0,003%

Semana epidemiológica 37
(06 de septiembre al 12 de septiembre 2020)

Tabla 2. Distribución de los nacimientos por municipio de residencia y ocurrencia registrados en Valle del Cauca; semana epidemiológica 37. Sin Buenaventura

| Municipio de Residencia | Frec. | % | Municipio de Ocurrencia | Frec. | % |
|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Alcalá | 55 | 0,19 | Alcalá | 20 | 0,07 |
| Andalucía | 114 | 0,40 | Andalucía | 2 | 0,01 |
| Ansermanuevo | 94 | 0,33 | Ansermanuevo | 27 | 0,09 |
| Argelia | 21 | 0,07 | Argelia | 17 | 0,06 |
| Bolívar | 88 | 0,31 | Bolívar | 12 | 0,04 |
| Bugalagrande | 144 | 0,50 | Bugalagrande | 1 | 0,00 |
| Caicedonia | 86 | 0,30 | Caicedonia | 34 | 0,11 |
| Cali | 16338 | 56,79 | Cali | 22341 | 73,19 |
| Calima | 136 | 0,47 | Calima | 42 | 0,14 |
| Candelaria | 774 | 2,69 | Candelaria | 56 | 0,18 |
| Cartago | 533 | 1,85 | Cartago | 539 | 1,77 |
| Dagua | 284 | 0,99 | Dagua | 60 | 0,20 |
| El Águila | 28 | 0,10 | El Águila | 14 | 0,05 |
| El Cairo | 26 | 0,09 | El Cairo | 16 | 0,05 |
| El Cerrito | 402 | 1,40 | El Cerrito | 38 | 0,12 |
| El Dovio | 99 | 0,34 | El Dovio | 48 | 0,16 |
| Florida | 460 | 1,60 | Florida | 113 | 0,37 |
| Ginebra | 111 | 0,39 | Ginebra | 14 | 0,05 |
| Guacarí | 270 | 0,94 | Guacarí | 18 | 0,06 |
| Buga | 821 | 2,85 | Buga | 1292 | 4,23 |
| Jamundí | 1266 | 4,40 | Jamundí | 186 | 0,61 |
| La Cumbre | 65 | 0,23 | La Cumbre | 14 | 0,05 |
| La Unión | 184 | 0,64 | La Unión | 23 | 0,08 |
| La Victoria | 53 | 0,18 | La Victoria | 4 | 0,01 |
| Obando | 61 | 0,21 | Obando | 23 | 0,08 |
| Palmira | 2215 | 7,70 | Palmira | 2117 | 6,94 |
| Pradera | 350 | 1,22 | Pradera | 52 | 0,17 |
| Restrepo | 115 | 0,40 | Restrepo | 19 | 0,06 |
| Riofrío | 90 | 0,31 | Riofrío | 9 | 0,03 |
| Roldanillo | 230 | 0,80 | Roldanillo | 513 | 1,68 |
| San Pedro | 97 | 0,34 | San Pedro | 2 | 0,01 |
| Sevilla | 239 | 0,83 | Sevilla | 231 | 0,76 |
| Toro | 52 | 0,18 | Toro | 14 | 0,05 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Trujillo | 121 | 0,42 | Trujillo | 26 | 0,09 |
| Tuluá | 1400 | 4,87 | Tuluá | 2312 | 7,57 |
| Ulloa | 8 | 0,03 | Ulloa | 2 | 0,01 |
| Versalles | 45 | 0,16 | Versalles | 12 | 0,04 |
| Vijes | 87 | 0,30 | Vijes | 4 | 0,01 |
| Yotoco | 101 | 0,35 | Yotoco | 15 | 0,05 |
| Yumbo | 835 | 2,90 | Yumbo | 100 | 0,33 |
| Zarzal | 269 | 0,94 | Zarzal | 142 | 0,47 |
| Total general | 28.767 | 100,00 | Total general | 30.524 | 100,00 |

Fuente: RUAF ND, BD Descargada el 25 de septiembre.

Defunciones

Las defunciones en la plataforma RUAF-ND, corresponde a las mortalidades por causa natural, mientras las de causa externa van al sistema del SIRDEC (del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses); sin embargo, desde de noviembre de 2.017 hay un cambio paulatino de migración, del SIRDEC al RUAF-ND.

Hasta la SE 37 se certificaron 22.802 defunciones, de estas 21.476 (94,18%) residían en Valle del Cauca, 8.9% fueron mortalidades fetales (Tabla 3). Esta información incluye datos de medicina Legal.

Tabla 3. Distribución de las defunciones por municipio de residencia y ocurrencia registrados en Valle del Cauca; semana epidemiológica 37. Sin Buenaventura

| Municipio de Residencia | Residencia | | | Ocurrencia | | |
|-------------------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|
| | Fetal | No Fetal | Total general | Fetal | No Fetal | Total general |
| Alcalá | | 72 | 72 | 34 | | 34 |
| Andalucía | 6 | 117 | 123 | 41 | | 41 |
| Ansermanuevo | 1 | 67 | 68 | 47 | | 47 |
| Argelia | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 14 |
| Bolívar | 3 | 69 | 72 | 50 | | 50 |
| Bugalagrande | 5 | 102 | 107 | 50 | | 50 |
| Caicedonia | 2 | 98 | 100 | 77 | | 77 |
| Cali | 1380 | 11540 | 12920 | 1865 | 14187 | 16052 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Calima | 3 | 67 | 70 | | 39 | 39 |
| Candelaria | 49 | 347 | 396 | | 169 | 169 |
| Cartago | 24 | 515 | 539 | 28 | 545 | 573 |
| Dagua | 19 | 165 | 184 | 1 | 110 | 111 |
| El Águila | | 36 | 36 | | 35 | 35 |
| El Cairo | 1 | 28 | 29 | | 21 | 21 |
| El Cerrito | 20 | 261 | 281 | | 149 | 149 |
| El Dovio | 2 | 46 | 48 | 2 | 40 | 42 |
| Florida | 27 | 258 | 285 | 1 | 139 | 140 |
| Ginebra | 15 | 84 | 99 | | 46 | 46 |
| Guacarí | 6 | 143 | 149 | | 77 | 77 |
| Buga | 17 | 568 | 585 | 15 | 656 | 671 |
| Jamundí | 74 | 518 | 592 | 2 | 290 | 292 |
| La Cumbre | 2 | 58 | 60 | | 34 | 34 |
| La Unión | 4 | 125 | 129 | | 94 | 94 |
| La Victoria | 4 | 58 | 62 | | 42 | 42 |
| Obando | 6 | 43 | 49 | | 30 | 30 |
| Palmira | 80 | 1518 | 1598 | 46 | 1396 | 1442 |
| Pradera | 14 | 187 | 201 | | 89 | 89 |
| Restrepo | 1 | 74 | 75 | | 47 | 47 |
| Riofrío | 4 | 58 | 62 | | 38 | 38 |
| Roldanillo | 3 | 156 | 159 | 6 | 108 | 114 |
| San Pedro | 5 | 57 | 62 | | 29 | 29 |
| Sevilla | 4 | 168 | 172 | 2 | 132 | 134 |
| Toro | 1 | 56 | 57 | | 41 | 41 |
| Trujillo | 4 | 74 | 78 | | 30 | 30 |
| Tuluá | 41 | 1042 | 1083 | 101 | 1370 | 1471 |
| Ulloa | | 18 | 18 | | 14 | 14 |
| Versalles | 3 | 36 | 39 | | 23 | 23 |
| Vijes | 9 | 54 | 63 | | 31 | 31 |
| Yotoco | 5 | 75 | 80 | | 39 | 39 |
| Yumbo | 58 | 415 | 473 | 5 | 219 | 224 |
| Zarzal | 6 | 174 | 180 | 1 | 105 | 106 |
| Total general | 1909 | 19567 | 21476 | 2076 | 20726 | 22802 |

Fuente: RUAf ND, BD Descargada el 25 septiembre.

2. ZONOSIS

➤ Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (AAPTR)

Hasta esta SE, se notificaron 6.313 casos de APTR. En la tabla 1 están la distribución de los casos por Mpio. y la incidencia. La incidencia en el Dpto. fue de 143,1 casos por cada 100.000 habitantes, los municipios de Andalucía, Bolívar, Caicedonia, Darién, Dagua Restrepo, la Victoria, la Cumbre, Roldanillo, Ulloa, Trujillo y Yotoco fueron los de mayor incidencia con mayor a 300 casos por 100.000 hts.(tabla 1).

Tabla 1. Casos e incidencia de APTR por mpio de procedencia, V. del C., SE 1 a 37.

| Municipios de procedencia | Casos | % | Incidencia x 100.000 hts |
|---------------------------|-------|-------|--------------------------|
| Alcalá | 44 | 0,96 | 185,83 |
| Andalucía | 61 | 1,33 | 344,69 |
| Ansermanuevo | 44 | 0,96 | 230,90 |
| Argelia | 11 | 0,24 | 174,02 |
| Bolívar | 42 | 0,91 | 332,38 |
| Buga | 282 | 6,14 | 247,28 |
| Bugalagrande | 67 | 1,46 | 320,48 |
| Caicedonia | 124 | 2,70 | 422,73 |
| Cali | 2448 | 53,28 | 98,06 |
| Candelaria | 76 | 1,65 | 86,54 |
| Cartago | 252 | 5,48 | 185,80 |
| Dagua | 174 | 3,79 | 470,21 |
| Darién | 59 | 1,28 | 371,19 |

Semana epidemiológica 37
(06 de septiembre al 12 de septiembre 2020)

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| El Águila | 15 | 0,33 | 132,63 |
| El Cairo | 15 | 0,33 | 145,12 |
| El Cerrito | 93 | 2,02 | 158,09 |
| El Dovio | 24 | 0,52 | 298,21 |
| Florida | 159 | 3,46 | 268,51 |
| Ginebra | 69 | 1,50 | 313,47 |
| Guacarí | 86 | 1,87 | 239,24 |
| Jamundí | 275 | 5,98 | 207,43 |
| La Cumbre | 60 | 1,31 | 509,16 |
| La Unión | 55 | 1,20 | 134,08 |
| La Victoria | 53 | 1,15 | 413,64 |
| Obando | 39 | 0,85 | 253,10 |
| Palmira | 422 | 9,18 | 134,22 |
| Pradera | 104 | 2,26 | 177,10 |
| Restrepo | 76 | 1,65 | 461,78 |
| Riofrío | 43 | 0,94 | 316,90 |
| Roldanillo | 114 | 2,48 | 358,02 |
| San Pedro | 59 | 1,28 | 304,25 |
| Sevilla | 124 | 2,70 | 283,45 |
| Toro | 29 | 0,63 | 173,14 |
| Trujillo | 59 | 1,28 | 331,54 |
| Tuluá | 206 | 4,48 | 91,85 |
| Ulloa | 22 | 0,48 | 418,25 |
| Versalles | 21 | 0,46 | 312,04 |
| Vijes | 40 | 0,87 | 342,32 |
| Yotoco | 56 | 1,22 | 336,46 |
| Yumbo | 220 | 4,79 | 167,12 |
| Zarzal | 91 | 1,98 | 191,44 |
| Total | 6313 | 137,39 | 143,1 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Los perros y los gatos son las especies que más agresiones provocaron con 99,01%, seguidos de 0,22% por murciélagos, grandes roedores, micos, porcinos bovino-bufalinos y otros silvestres. De acuerdo con la clasificación de las agresiones, se notificaron 1690 casos (26,77%) como exposiciones leves y 790 casos (12,51%) como graves; de los casos notificados como graves a 71 (1,3%) no se les aplicó suero y a 113 (2,9) casos de los notificados como leves no se les aplicó la respectiva vacuna (Tabla 2).


Tabla 2. Aplicación de suero y vacuna según tipo de exposición, AAPTR, V. del C., semanas 1 a 37 2020.

| Tipo de Exposición vacuna | Aplicación de suero | | | | Aplicación de vacuna | | | |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | Si | % | No | % | Si | % | No | % |
| No exposición | 7 | 0,9 | 3824 | 69,4 | 48 | 2,0 | 3783 | 96,8 |
| Exposición Leve | 71 | 8,9 | 1619 | 29,4 | 1577 | 65,7 | 113 | 2,9 |
| Exposición Grave | 719 | 90,2 | 71 | 1,3 | 776 | 32,3 | 14 | 0,4 |
| Total | 797 | 100 | 5514 | 100 | 2401 | 100 | 3910 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

En el canal endémico se observa que, en lo que va del año, durante las SE 1, 5, 6, 7 y 10 las AAPTR estuvieron por encima de lo esperado, y en las SE 12 a 37, por debajo (Gráfica 1).

Gráfica 1. Canal endémico para AAPTR, Valle del Cauca, SE 1 a 37 de 2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ Leptospirosis

Hasta la SE 37 se notificaron 282 casos. La incidencia en el departamento fue de 643 casos por cada 100 mil habitantes y Buga tuvo la mayor, con 40.

El canal endémico mostró que los casos notificados en las SE 4, 5, 8, 17, 21, 27, 30, 31, 32 y 36 estuvieron por encima de lo esperado,

Gráfica 2. Canal endémico de leptospirosis, Valle del Cauca, semanas 1 a 37 de 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

El municipio de Cali notificó dos muertes, de ellas una fue descartada, y otra quedó en estudio; y a Palmira se le descartó una muerte.

Comparando el promedio histórico de los casos acumulados de los años 2013 a 2019, con los casos acumulados del 2020, El Valle y los municipios de: Buga, Cali, Cartago, Tuluá, Yumbo presentan un aumento estadísticamente significativo de casos de Leptospirosis.

➤ Accidentes ofídicos

Hasta la SE 37 se notificaron 46 casos de accidentes ofídicos procedentes de Valle del Cauca, La incidencia (casos por cada 100.000 habitantes) Departamental fue de 7,8 por 100 mil, los municipios de mayor incidencia fueron Trujillo y Versalles 42 y 49 casos por 100 mil habitantes cada uno, (tabla 3).

Tabla 3. Casos e incidencia accidentes ofídico, Valle del Cauca. Semanas 1 a 37 de 2020.

| Municipios | Casos | Incidencia x 100000 | % |
|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| Andalucia | 1 | 20,35 | 2,3 |
| Argelia | 1 | 31,01 | 2,3 |
| Bolívar | 3 | 32,08 | 7,0 |
| Buga | 4 | 25,89 | 9,3 |
| Cali | 2 | 4,26 | 4,7 |
| Dagua | 10 | 34,61 | 23,3 |
| Darien | 1 | 15,50 | 2,3 |
| El Aguila | 1 | 11,79 | 2,3 |
| Florida | 1 | 6,51 | 2,3 |
| Ginebra | 2 | 18,19 | 4,7 |
| Guacari | 1 | 7,79 | 2,3 |
| Jamundi | 1 | 2,70 | 2,3 |
| La Cumbre | 1 | 7,37 | 2,3 |
| Obando | 1 | 34,15 | 2,3 |
| Riofrío | 2 | 22,71 | 4,7 |
| Roldanillo | 1 | 11,45 | 2,3 |
| San Pedro | 1 | 10,61 | 2,3 |
| Trujillo | 4 | 41,88 | 9,3 |
| Tulua | 2 | 4,90 | 4,7 |
| Versalles | 2 | 49,43 | 4,7 |
| Yotoco | 3 | 38,63 | 7,0 |
| Yumbo | 1 | 6,67 | 2,3 |
| Total | 46 | 7,8 | 107,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Comparado el promedio histórico de los casos acumulados de los años 2013 a 2019, con los casos acumulados del 2020, los municipios de Buga, Dagua y Yotoco presentan un aumento estadísticamente significativo de casos de Accidentes ofídicos.

Del total de casos notificados, 39 el (85,0 %) tienen algún grado de severidad, siendo más frecuente el leve con 26 casos, de los cuales dos recibieron tratamiento, seguido de 11 casos moderados 5 recibieron tratamiento y 2 graves que recibieron tratamiento.


3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

➤ Dengue

Hasta la SE 37 se notificaron 25220 casos, 13184 (52,2%) sin signos de alarma y 11737 (46,5%) con signos de alarma; se notificaron 225 casos de dengue grave y 50 muertes notificadas, 1 procede del Distrito de Buenaventura, 3 proceden del Cauca, 24 descartadas, de los 22 restantes procedentes del Valle: hay 15 confirmadas, 3 son compatibles 4 están en estudio, para una letalidad del 6,7%.

El mayor número de casos lo ha reportado el municipio de Cali: 11158 (44,7%) casos. La incidencia del dengue en el Dpto. es de 688 casos por 100.000 habitantes. Las mayores incidencias las tuvieron Candelaria, Ginebra y Bugalagrande (Gráfica 1).


Gráfica 1. Incidencia de dengue por municipio de procedencia, Valle, semanas epidemiológicas 01-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

En el canal endémico para el dengue, los casos han estado por encima de lo esperado, con relación al histórico (2013-2019) , (Gráfica 2).

Gráfica 2. Canal endémico dengue, Valle del Cauca, semanas 1-37, 2020.



Fuente:

SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

La comparación de los casos de dengue en el periodo IX del año 2020 (semanas 33, 34 35 y 36), con el promedio histórico de casos de los años 2013 a 2019, en el mismo periodo, muestra que los municipios de Argelia, Bolívar, Caicedonia, La Cumbre, La Victoria, Restrepo, Riofrio, Roldanillo, Sevilla, Tuluá, Versalles y Zarzal están dentro de lo esperado, La Unión está por debajo de lo esperado, el resto de los municipios y el Valle, están por encima de lo esperado.

El Valle y los municipios de Buga, Cali, Candelaria, Cartago, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo presentan un incremento estadísticamente significativo de casos de dengue grave.

El porcentaje de confirmación de casos de DCSA para el Valle fue de 52,0%. Los municipios del Dovio y Obando tienen el 100% de los

casos confirmados; para el V. del C. se ha confirmado el 70,0 % casos de dengue grave.

Los municipios con casos de DCSA con más hospitalizados fueron El Águila, El Cairo y Ulloa. El porcentaje total de hospitalizaciones en el Dpto. fue de 73,4%, y un porcentaje de remisión del 8,0% de los casos. Se han hospitalizado el 97,0% de los casos de dengue grave y un porcentaje de remisión del 2.0%.

➤ Malaria

Hasta la SE 37 se notificaron 62 casos originados en el Departamento, 54,8% fue por *P. falciparum*, 37,2% por *P. vivax*; 3,2% por *P. malariae* y 4,8% por infección mixta; 60,0% procedía de Cali y no hubo muertes.

Tabla 1. Casos notificados de malaria por Mpio. de procedencia, V. del C., SE 1 a 37 2020.

| Municipios | P. vivax | P. falciparum | P. malariae | I. mixta | Total | % |
|--------------|----------|---------------|-------------|----------|-------|------|
| Cali | 8 | 26 | 2 | 0 | 36 | 58,1 |
| Florida | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6,5 |
| Jamundi | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,8 |
| Bugalagrande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Palmira | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,5 |
| Caicedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Tulua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,2 |
| Candelaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,2 |
| Pradera | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,2 |
| Riofrio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Buga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|
| La Victoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Yotoco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Zarzal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Dagua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,6 |
| Total | 23 | 34 | 2 | 3 | 62 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

El índice parasitario anual (IPA) de malaria fue de 0,11 casos por cada 1.000 habitantes en riesgo (área rural). Cali presenta el IPA municipal más alto con 0.98 (Tabla 2).


Tabla 2. Incidencia de malaria por Mpio de procedencia, V. del C., SE 1 a 37 2020

| Municipios | IPA | IFA | IVA |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Cali | 0,98 | 0,71 | 0,22 |
| Florida | 0,26 | 0,20 | 0,07 |
| Jamundi | 0,07 | 0,02 | 0,05 |
| Bugalagrande | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Palmira | 0,06 | 0,00 | 0,05 |
| Caicedonia | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| Sevilla | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| Tulua | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Candelaria | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Pradera | 0,33 | 0,16 | 0,00 |
| Riofrío | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| Buga | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| La Victoria | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| Yotoco | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| Zarzal | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| Dagua | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Total | 0,11 | 0,06 | 0,04 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

El canal endémico para malaria se ubicó por arriba de lo esperado en las semanas 4, 6, 10 y 12. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Canal endémico de malaria, Valle del Cauca, semanas 1 a 37 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Leishmaniasis

A SE 37 hubo 10 casos originados en Valle del Cauca, todos los casos fueron notificados como leishmaniasis cutánea.

El Valle presentó una incidencia de 1,9 casos por 100 mil habitantes, los municipios de Ulloa con 34,4 y El Águila con 32,2 casos por 100 mil habitantes fueron los de mayor incidencia (tabla 3).

Tabla 3. Casos e Incidencia de leishmaniasis en el Valle del Cauca, semana 1 a 37, 2020.

| Municipio procedencia | L. cutánea | L. mucosa | Total | % | **Incidencia* 100.000 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|
| Bolivar | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 16,9 |
| Cali | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 2,1 |
| Dagua | 2 | 0 | 2 | 20,0 | 5,3 |
| El Aguila | 2 | 0 | 2 | 20,0 | 32,2 |
| El Dovio | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 31,2 |
| Ulloa | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 34,4 |
| Palmira | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 1,3 |
| El Cairo | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 29,6 |
| Total | 10 | 0 | 10 | 100,0 | 1,7 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Las personas que laboran como trabajadores forestales y militares cada con el 40,0% y el 30% respectivamente fueron los más afectados (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución casos de leishmaniasis por ocupación, en el Valle del Cauca, semana 1 a 37 2020

| Ocupaciones | Casos | % |
|---------------------|-----------|--------------|
| Trabajador forestal | 3 | 30,0 |
| Militar | 4 | 40,0 |
| No aplica | 1 | 10,0 |
| Hogar | 1 | 10,0 |
| Agricultor | 1 | 10,0 |
| Total | 10 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ Chagas, fiebre amarilla y encefalitis


No se han notificado casos.

4. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y/O AGUA

➤ Hepatitis A.

Hasta la SE 37 hubo 60 casos, de estos 58 procedían del Valle del Cauca, y 1 de Cauca y hubo dos duplicados (n=2) y ajuste 6 (n=1). La incidencia hasta esta SE fue 1,3 a nivel departamental. Se presentó un 82,7% en el municipio de Cali y 5,7% en el municipio de Florida y el municipio de Candelaria 1,7%. Entre los privados de la libertad no hubo casos.

Gráfica 1. Canal endémico de infección por virus de Hepatitis A, Valle del cauca, semana epidemiológica 1-37, 2020




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Fiebre Tifoidea

Hasta la semana 37 se notificaron 10 casos, de ellos 8 procedían de Valle del Cauca, se descarta (ajuste D=1) y 2 casos del

Departamento de Cauca. Seis fueron confirmados en los laboratorios institucionales de UPGD de Cali. Siete muestras se enviaron al INS para su análisis. Hasta esta semana no hubo registros del evento.

Gráfica 2. Canal endémico de infección fiebre tifoidea, Valle del cauca, semana epidemiológica 1-37, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Cólera

Hasta la SE 37 no hubo casos. Se mantiene la vigilancia rutinaria como evento de interés internacional.

➤ Brotes y alertas departamentales

A continuación, se relacionan los brotes que cumplen con criterios de notificación inmediata (población confinada o cautiva, productos de alta comercialización o aquellos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005 (anexo 2), los relacionados con ETA y/o EDA notificados a semana epidemiológica 37, de 2020 (ver tabla # 1).

Tabla 1. Brotes de ETA, Valle del cauca, semanas epidemiológicas 1-37, 2020

| Brote # | Municipio de procedencia | Semana | Lugar | # Enfermos | # Expuestos | Tasa de ataque |
|---------|--------------------------|--------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 1 | Cali | 1 | Otros | 8 | 8 | 100% |
| 2 | Cali | 1 | Hogar | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Cali | 1 | Hogar | 16 | 16 | 100% |
| 4 | Cali | 1 | Hogar | 8 | 8 | 100% |
| 5 | Palmira | 2 | Restaurante | 6 | 6 | 100% |
| 6 | Cali | 2 | Otros | 37 | 37 | 100% |
| 7 | Cali | 3 | Casino | 11 | 194 | 5,7% |
| 8 | Florida | 4 | Hogar | 2 | 2 | 100% |
| 9 | Cartago | 4 | Hogar | 3 | 8 | 37,5% |
| 10 | Yumbo | 5 | Hogar | 2 | 2 | 100% |
| 11 | Florida | 6 | Hogar | 3 | 3 | 100% |
| 12 | Buga | 7 | Otros | 6 | 6 | 100% |
| 13 | La Unión | 8 | Hogar | 9 | 9 | 100% |
| 14 | Cartago | 8 | Est. Militar | 16 | 47 | 34% |
| 15 | Buga | 9 | Otros | 17 | 17 | 100% |
| 16 | Cali | 12 | Hogar | 5 | 5 | 100% |
| 17 | Cali | 12 | Hogar | 7 | 7 | 100% |
| 18 | Buga | 19 | Est. Militar | 31 | 251 | 12,3% |
| 19 | Trujillo | 20 | Hogar | 9 | 14 | 62,2% |
| 20 | La Victoria | 21 | Hogar | 3 | 3 | 100% |
| 21 | Yumbo | 22 | Cárcel | 3 | 3 | 100% |
| 22 | Palmira | 27 | Cárcel | 67 | 600 | 12% |
| 23 | Palmira | 27 | Hogar | 4 | 4 | 100% |
| 24 | Cali | 29 | Hogar | 3 | 3 | 100% |

| | | | | | | |
|----|------------|----|-------|----|----|-------|
| 25 | Cali | 31 | Hogar | 3 | 3 | 100% |
| 26 | Cali | 32 | Hogar | 2 | 2 | 100% |
| 27 | Tuluá | 33 | Hogar | 3 | 3 | 100% |
| 28 | Cartago | 34 | Hogar | 5 | 6 | 83% |
| 29 | Roldanillo | 34 | Hogar | 5 | 15 | 33% |
| 30 | Palmira | 34 | Hogar | 2 | 2 | 100% |
| 31 | Restrepo | 36 | Hogar | 13 | 15 | 86,6% |
| 32 | Caicedonia | 36 | Hogar | 5 | 5 | 100% |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Hasta la semana 37 han ingresado 32 brotes, de éstos 13 corresponden con brotes de notificación inmediata (ETA:13) y (ETA:19) sin criterio de notificación inmediata.


➤ Enfermedad diarreica aguda (EDA)

Hasta la SE 37 de 2020, se notificaron 129.592 casos de EDA en todos los grupos de edad. Valle del Cauca registró una incidencia general de 30,7 casos por cada 1000 habitantes. El 99.8% de los pacientes requiere atención ambulatoria y el 0.1% requiere hospitalización. Los municipios de Cali (41,75), Bugalagrande (41,61), Riofrío (41,00) y Ulloa (40,70) son los de mayor incidencia. Otros municipios que superan la incidencia del departamento son: La Victoria (33,29), Florida (32,76) Yumbo (31,40) y Buga (30,70).

En cuanto a las características sociodemográficas, tenemos que hasta la semana 37, los menores de 1 año presentan la mayor incidencia (71,9 casos), seguido de los menores de 1 a 4 años (52,1 casos) por cada 1000 habitantes. Así mismo, las mujeres presentan una incidencia mayor con respecto a los hombres siendo de 30,8 casos por cada 1000 habitantes, frente a los hombres que es de 30,6 casos por cada 1000 habitantes

El canal endémico indica que estamos en zona de éxito y que no estamos en brote (Gráfica # 3).

Gráfica 3. Canal endémico para EDA, semanas 1-37, Valle del Cauca, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

De igual manera, en la semana 37, se notificaron 1612 casos de EDA, esto representa una disminución del 70,9% con respecto a la misma semana del año anterior donde se notificaron 6110 casos. Los municipios de Argelia y Yotoco no reportaron ningún caso de EDA en esta semana.

5. INMUNOPREVENIBLES

➤ Sarampión – Evento en eliminación y alerta nacional


Durante la semana epidemiológica 37 de 2020 no se notificaron casos sospechosos de sarampión; en lo corrido del año se han notificado 8 casos sospechosos procedentes del Valle del Cauca, 2 casos descartados por laboratorio, 5 casos descartados mediante unidad de análisis y 1 caso pendiente de análisis. Hasta la semana 37 de 2019 se habían notificado 27 casos sospechosos evidenciándose una disminución en la notificación del 70,3 % respecto al año anterior.

Tabla 1. Casos notificados de sarampión, procedencia Valle del Cauca, 2020

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|------------|----------|--------|------------|------------|
| Yumbo | 2 años | Mujer | Asmetsalud | Descartado |
| Buga | 15 años | Hombre | Emssanar | Descartado |
| Jamundí | 3 años | Hombre | Coomeva | Descartado |
| Roldanillo | 11 años | Mujer | SOS | Descartado |
| | 9 meses | Mujer | Coosalud | Descartado |
| | 19 años | Mujer | Medimas | Descartado |
| Restrepo | 10 meses | Hombre | Nueva EPS | Descartado |
| Palmira | 2 años | Hombre | Comfenalco | Sospechoso |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 1. Comportamiento en la notificación de Sarampión, procedencia Valle del Cauca, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

La meta de notificación de sarampión es de 2 casos por 10⁵ habitantes al año; cada municipio debe cumplir con esta meta o cumplir con la realización de la búsqueda activa institucional de casos sospechosos, que evidencia la ausencia de casos.

Tabla 2. Meta de notificación sarampión por municipio, procedencia Valle del Cauca, año 2020

| Municipio | Población DANE 2020 | Meta de notificación año 2020 | Casos notificados sospechosos sarampión | Cumplimiento Meta año 2020 |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| Cali | 2.496.442 | 50 | 0 | 0,0 |
| Alcalá | 23.677 | 1 | 0 | 0,0 |
| Andalucía | 17.697 | 1 | 0 | 0,0 |
| Arsermanuevo | 19.056 | 1 | 0 | 0,0 |
| Argelia | 6.321 | 1 | 0 | 0,0 |
| Bolívar | 12.636 | 1 | 0 | 0,0 |
| Guadalajara de Buga | 114.041 | 3 | 1 | 0,9 |
| Bugalagrande | 20.906 | 1 | 0 | 0,0 |
| Caicedonia | 29.333 | 1 | 0 | 0,0 |
| Calima | 15.895 | 1 | 0 | 0,0 |
| Candelaria | 87.820 | 2 | 0 | 0,0 |
| Cartago | 135.629 | 3 | 0 | 0,0 |
| Dagua | 37.005 | 1 | 0 | 0,0 |
| El Águila | 11.310 | 1 | 0 | 0,0 |
| El Cairo | 10.336 | 1 | 0 | 0,0 |
| El Cerrito | 58.829 | 1 | 0 | 0,0 |
| El Dovío | 8.048 | 1 | 0 | 0,0 |
| Florida | 59.215 | 1 | 0 | 0,0 |
| Ginebra | 22.012 | 1 | 0 | 0,0 |
| Guacarí | 35.947 | 1 | 0 | 0,0 |
| Jamundí | 132.572 | 3 | 1 | 0,8 |
| La Cumbre | 11.784 | 1 | 0 | 0,0 |
| La Unión | 41.020 | 1 | 0 | 0,0 |
| La Victoria | 12.813 | 1 | 0 | 0,0 |
| Obando | 15.409 | 1 | 0 | 0,0 |
| Palmira | 314.411 | 7 | 1 | 0,3 |
| Pradera | 58.724 | 1 | 0 | 0,0 |
| Restrepo | 16.458 | 1 | 1 | 6,1 |
| Riofrío | 13.569 | 1 | 0 | 0,0 |
| Roldanillo | 31.842 | 1 | 3 | 9,4 |
| San Pedro | 19.392 | 1 | 0 | 0,0 |
| Sevilla | 43.746 | 1 | 0 | 0,0 |
| Toro | 16.749 | 1 | 0 | 0,0 |
| Trujillo | 17.796 | 1 | 0 | 0,0 |
| Tuluá | 224.280 | 5 | 0 | 0,0 |
| Ulloa | 5.260 | 1 | 0 | 0,0 |
| Versalles | 6.730 | 1 | 0 | 0,0 |
| Vijes | 11.685 | 1 | 0 | 0,0 |
| Yotoco | 16.644 | 1 | 0 | 0,0 |
| Yumbo | 131.645 | 3 | 1 | 0,8 |
| Zarzal | 47.534 | 1 | 0 | 0,0 |

Fuente: DANE 2020 - Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Rubeola – evento en eliminación**


Durante la semana epidemiológica 37 de 2020 no se notificaron casos sospechosos de rubéola; en lo corrido del año se han notificado 2 casos procedentes del Valle del Cauca, uno descartado por error de digitación y otro descartado mediante unidad de análisis; hasta la semana 37 de 2019 se habían notificado 5 casos sospechosos evidenciándose una disminución en la notificación del 60 % respecto al año anterior.

Tabla 3. Casos notificados de Rubeola, procedencia Valle del Cauca, 2020

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|-----------|--------|--------|------|------------|
| Cali | 1 año | Hombre | SURA | Descartado |
| | 6 años | Hombre | SURA | Descartado |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 2. Comportamiento en la notificación de Rubéola, procedencia Valle del Cauca, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Síndrome de rubéola congénita – evento en eliminación**


Durante la semana epidemiológica 37 de 2020 no se notificaron casos sospechosos de síndrome de rubeola congénita; en lo corrido del año se han notificado 5 casos procedentes del Valle del Cauca, 1 caso descartado por laboratorio, 2 casos pendientes de reporte de laboratorio y 2 casos pendientes de análisis; de éstos casos 3 fueron encontrados por búsqueda activa institucional. Hasta la semana 37 de 2019 se habían notificado 4 casos sospechosos evidenciándose un aumento en la notificación del 20 %.

Tabla 4. Casos notificados de Síndrome de Rubeola Congénita, procedencia Valle del Cauca, 2020

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|--------------|---------|--------|-----------|----------------------------------|
| Cali | 1 mes | Mujer | Emssanar | Pendiente reporte de laboratorio |
| Palmira | 1 día | Hombre | Emssanar | Descartado |
| Bugalagrande | 5 meses | Mujer | Nueva EPS | Descartado |
| Candelaria | 3 meses | Hombre | Emssanar | Pendiente reporte de laboratorio |
| Sevilla | 3 meses | Mujer | SOS | Pendiente de unidad de análisis |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 3. Comportamiento en la notificación de Síndrome de Rubeola Congénita, procedencia Valle del Cauca, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Parálisis flácida aguda – evento en erradicación**


Durante la semana epidemiológica 37 se notificó 1 caso probable de parálisis flácida aguda - PFA procedente del Valle; en lo corrido del año se han notificado 7 casos procedentes del Valle del Cauca, 1 caso descartado mediante unidad de análisis, 4 casos descartados por laboratorio y 2 casos pendientes de reporte. Hasta la semana 37 de 2019 se habían notificado 10 casos probables de PFA, evidenciándose una disminución en la notificación de 30%.

Tabla 5. Casos notificados de PFA, procedencia Valle del Cauca, 2020

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|--------------|---------|--------|--------------|------------|
| Cali | 11 años | Mujer | SURA | Descartado |
| | 10 años | Hombre | Nueva EPS | Descartado |
| | 6 años | Hombre | No asegurado | Descartado |
| | 6 años | Mujer | Asmetsalud | Probable |
| | 9 años | hombre | Sanitas | Probable |
| Ansermanuevo | 8 años | Hombre | Medimas | Descartado |
| Palmira | 11 años | Mujer | Salud Total | Descartado |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 4. Comportamiento en la notificación de PFA, procedencia Valle del Cauca, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Difteria – evento en control y alerta nacional**

Durante el año 2020 no han sido notificados casos probables de difteria procedentes del Valle del Cauca.

➤ **Evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización – ESAVI GRAVE – Evento en control**

Durante la semana epidemiológica 37 de 2020 se notificó un caso sospechoso de ESAVI grave procedente de Calima Daien que no cumple criterios. En lo corrido del año se han notificado 22 casos procedentes del Valle del Cauca; 14 de estos casos cumplen criterios de gravedad. Hasta la semana 37 de 2019 fueron notificados 45 casos sospechosos procedentes del Valle evidenciándose una disminución en la notificación del 51,1 % respecto al año anterior.


Tabla 6. Comportamiento en la notificación de casos que cumplen con definición de ESAVI GRAVE, procedencia Valle del Cauca, 2020.

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|-----------|---------|--------|------------|-----------------------------|
| Cali | 1 año | Hombre | Coosalud | Descartado |
| | 5 años | Mujer | Coomeva | Relacionado con el programa |
| | 56 años | Mujer | UniValle | Descartado |
| | 6 meses | Hombre | SURA | Descartado |
| | 5 años | Mujer | AIC | Sospechoso |
| | 4 meses | Hombre | SURA | Sospechoso |
| | 5 años | Mujer | Sanitas | Sospechoso |
| | 5 años | Mujer | Comfenalco | Sospechoso |

| | | | | |
|------------|----------|--------|------------|-----------------------------|
| Palmira | 4 meses | Mujer | SOS | Relacionado con el programa |
| Yumbo | 4 meses | Mujer | Nueva EPS | Descartado |
| | 5 años | Hombre | Asmetsalud | Sospechoso |
| Tuluá | 1 año | Hombre | Ponal | Descartado |
| Cartago | 63 años | Mujer | Coosalud | Descartado |
| El Cerrito | 18 meses | Mujer | Nueva EPS | Relacionado con la vacuna |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 5. Comportamiento en la notificación de ESAVI GRAVE, procedencia Valle del Cauca, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ Tétanos neonatal - evento en eliminación

Durante el año 2020 no han sido notificados casos probables de tétanos neonatal.

➤ Tétanos accidental - evento en control


Durante la semana epidemiológica 37 de 2020 no se notificó casos probables de tétano accidental; en lo corrido del año se han notificado 2 casos probables procedentes de Guacarí y Cali .

Tabla 7. Casos probables de Tétanos accidental, procedencia Valle del Cauca, 2020

| Municipio | Edad | Sexo | EAPB | Definición |
|-----------|---------|--------|-----------|------------|
| Guacarí | 78 años | Hombre | NUEVA EPS | Probable |
| Cali | 62 años | Hombre | EMSSANAR | Probable |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Gráfica 6. Comportamiento en la notificación de Tétanos accidental, procedencia Valle del Cauca, 2020




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Meningitis - Evento en control**

Durante la semana 37, se notificó 0 casos sospechosos por de MBA, para un total de 53 casos probables en lo recorrido de 2020. Durante el mismo período de 2019 hubo 120 casos probables notificados, es decir se observa una disminución del 55,8 % en la notificación con respecto al año inmediatamente anterior.

Gráfica 7. Comportamiento en la notificación de Meningitis Bacteriana Aguda, procedencia Valle del Cauca, 2019 – 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2019-2020

Mortalidad por meningitis

Se han notificado 8 casos de mortalidad, la relación de los mismos se muestra a continuación.

Tabla 8. Casos notificados fallecidos por meningitis en el V. del C. 2020

| Municipios | Casos fallecidos | H. influenza | Neisseria Menig | Pneumoniae | Otros agentes | Pendientes identificación germen |
|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|
| Cali | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sevilla | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Florida | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |


Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, V. del C., Colombia.

➤ **Tos ferina - Evento en Control**

En la semana 37, se notificó 0 casos probable de TF, para un total de 38 casos en lo corrido del año. Durante el mismo período de 2019 hubo 96 casos probables (Gráfica). A la fecha 5 casos notificados por Bordetella Pertusis del municipio de Cali

Se evidencia una disminución del 60,4 % de los casos notificados con respecto al año inmediatamente anterior.

Gráfica 8. Comportamiento en la notificación de tosferina, procedencia Valle del Cauca, 2019 – 2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2019 - 2020

➤ **Parotiditis - Evento en Control**

En la semana epidemiológica 37, se notificó 1 casos de Parotiditis, con un total de 324 casos notificados de los cuales el 38,6 % corresponden al municipio de Palmira seguido del municipio de Cali con un 36,7 % y en tercer lugar el municipio de Tuluá con un 11,7%.

La gráfica muestra que los casos de parotiditis notificados en el año en curso presentan una disminución del 35,6% con respecto a la notificación del año inmediatamente anterior

Gráfica No. 9. Gráfica. Comportamiento en la notificación de parotiditis, procedencia Valle del Cauca, semana 37, 2019 – 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Centros penitenciarios, Fuerza militares y Policía

Tabla 9. Centros penitenciarios, Fuerza militares y Policía

| Número | Institución | Municipio | Enfermos | Población expuesta | Estado | Fecha de Notificación |
|--------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Escuela Policía | Tuluá | 35 | 260 | Cerrado | 09/03/2020 |
| 2 | Sanidad Militar Emavi | Cali | 2 | - | Cerrado | 14/01/2020 |
| 3 | Centro Penitenciario | Palmira | 112 | 666 | Abierto | 11/07/2020 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Varicela - evento en control**

En la semana epidemiológica 37, se notificaron 14 casos de Varicela individual, distribuidos en las diferentes semanas con un total de 1304 casos notificados de los cuales el 58,6 % corresponden al municipio de Cali seguido del municipio de Palmira con un 6,6 % y en tercer lugar el municipio de Buga con un 4,7 %.

La gráfica muestra que los casos de varicela notificados en el año en curso presentan una disminución del 66,8 % con respecto a la notificación del año inmediatamente anterior.

Gráfica No. 10. Comportamiento en la notificación de varicela, procedencia Valle del Cauca, semana 37, 2019 – 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2019.

En la tabla 10 se describen los brotes que han ocurrido en lo que va del año.

Tabla 10. Centros penitenciarios, Fuerza militares y Policía

| Número | Institución | Municipio | Enfermos | Población expuesta | Estado | Fecha de Notificación |
|--------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Batallón Agustín Codazzi | Palmira* | 2 | 5994 | Cerrado | 17/02/2020 |
| 2 | Batallón Policarca Salavarría | Cali* | 4 | 2110 | Cerrado | 28/03/2020 |
| 3 | Sanidad Militar Emavi | Cali | 1 | - | Cerrado | 18/02/2020 |
| 4 | Sanidad Policía Buga | Buga | 1 | - | Cerrado | 8/02/2020 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------|----|---|---------|------------|
| 5 | Inpec Villanueva | Cali | 39 | - | Cerrado | 16/03/2020 |
| 6 | INPEC Tuluá | Tuluá | 2 | - | Cerrado | 24/04/2020 |
| 7 | Epam Palmira | Palmira | 1 | - | Abierto | 20/06/2020 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2019.


Vigilancia integrada de la IRA

➤ Vigilancia de infección respiratoria aguda grave inusitada

Respecto al comportamiento del evento hasta la semana 37 de 2020, han sido notificados al SIVIGILA en el departamento del Valle del Cauca, un total de 6413 casos como infección aguda grave inusitada, de los cuales solo 1619 cumplen con criterio de caso. El número de notificaciones empieza a disminuir dada la decisión del INS de suspender la notificación de SARS COV2 en la ficha 348. Sin embargo, aún se notifican casos probables y confirmados en algunos municipios.

En la semana epidemiológica 37 de 2020, se notificaron 31 casos, de los cuales 18 notificaciones cumplieron con criterio para definición de caso, con un promedio levemente mayor que en el 2019. De estos 18 casos, 1 fue confirmado por laboratorio. Respecto al sexo, tuvo igual notificación en ambos, los grupos etarios de mayor representación fueron el de 50-59 años y el de mayores de 60 años con 33% y 27%, respectivamente.

Gráfica 11. Comparación de la notificación de Infección respiratoria aguda grave inusitada, Valle del Cauca, semanas epidemiológicas 01-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020


Se presentó 1 mortalidad, de 74 años, no se presentan comorbilidades. El tiempo de hospitalización fue de 2 días, el caso es de procedencia de la ciudad de Cali.

➤ **Vigilancia centinela de enfermedad similar a la influenza e infección respiratoria aguda grave**

En la semana epidemiológica 37, la notificación de casos de ESI-IRAG centinela se comporta por debajo del umbral estacional (Grafico), este cambio secundario a la decisión del INS, de suspender la notificación de SARS COV2 en la ficha 345. En la semana 37 se notificaron 98 casos, de los cuales **10** cumplían con el criterio de síntomas. En relación a la notificación por Enfermedad similar a la influenza (ESI) en el departamento del Valle del Cauca, 2 cumplen con criterio para definición de caso de ESI, según el INS, de estos, se presentó **1** caso notificado en la ESE de Siloé, unidad notificadora

para ESI, el cual es un caso femenino de 1 año, sin confirmación por laboratorio.

Gráfica 12. Comportamiento de la notificación de casos de enfermedad similar a la influenza e infección respiratoria aguda grave, Valle del Cauca, hasta semana epidemiológica 37--2020




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Respecto al IRAG, **8** cumplen con criterio para definición de caso según el INS, ninguno ha sido confirmado por laboratorio. Respecto a la edad, se presenta 1 caso femenino de 6 años, 3 (37.5%) de ellos se encuentran en el grupo etario de mayores de 60 años, los cuatro restantes se encuentran entre 34 y 51 años. Según el sexo, tienen igual distribución. Los casos son de procedencia de Cali y Jamundí.

➤ **Vigilancia de morbilidad por Infección Respiratoria Aguda IRA**

Para el Valle del Cauca, el comportamiento de la morbilidad por IRA muestra que hasta la semana 37 se han notificado 228.871 consultas externas y urgencias de un total de 5.575.137 consultas externas y urgencias por todas las causas, obteniendo una proporción del 4,11%. En la SE 37 se notificaron 3.613 casos. La notificación de casos se encuentra por debajo del umbral estacional (11.445).


Gráfica 13. Consultas externas y de urgencias por IRA SE 37 de 2020. Comportamiento histórico, Valle del Cauca, 2015-2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Hasta la semana 37 se han notificado 6.057 hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave (IRAG) de 127.277 hospitalizaciones por todas las causas, obteniendo una proporción de 4,76%. Hasta esta misma SE, se notificaron 1.080 hospitalizaciones en las UCI por IRAG de 9.945 hospitalizaciones, en las UCI, por todas las causas, la proporción fue de 10,86%. La cantidad de hospitalizaciones en UCI por IRAG supera el límite superior histórico para SE 37.

Gráfica 14. IRA en UCI SE 37 de 2020. Comportamiento histórico, Valle del Cauca, 2015-2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

6. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD

➤ Infecciones asociadas a dispositivos IAD

En la semana epidemiológica 37 se notificaron un total de 693 casos notificados en el 2020, posterior al proceso de depuración se encontraron 610 eventos reportados. De los cuales, el 90% ocurrieron en Unidades de Cuidados Intensivos del municipio de Cali.

El mayor número de infecciones notificadas fueron las Infecciones del Torrente Sanguíneo seguidas de las Neumonías Asociadas a Ventilador NAV y las Infecciones sintomáticas del tracto urinario. El servicio con mayor porcentaje de casos reportados de infecciones fue UCI Adulto.

Tabla 1. IAD distribuidas por servicios Valle del Cauca semana 36 de 2020

| Tipo de UCI | NAV | % | ISTU-A | % | ITS-AC | % | Total | % |
|-------------------|-----|------|--------|------|--------|------|-------|------|
| UCI Adulto | 97 | 72,4 | 156 | 96,9 | 239 | 75,2 | 492 | 80,3 |
| UCI | 23 | 17,2 | 5 | 3,1 | 53 | 16,7 | 81 | 13,2 |
| Pediátrica | | | | | | | | |
| UCI | 14 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8,2 | 40 | 6,5 |
| Neonatal | | | | | | | | |
| Total | 134 | 100 | 161 | 100 | 318 | 100 | 613 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Endometritis puerperal

Hasta la semana epidemiológica 37 se han notificado 10 casos de endometritis puerperal, 91% derivada de parto vaginal y 9% derivados de parto por cesárea, procedentes de 4 municipios.

Tabla 2. Municipio que han notificado Endometritis puerperal Valle del Cauca 2020

| Municipio | No. Casos Notificados | No partos certificados | % Endometritis puerperal |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Cali | 7 | 15785 | 0,0 |
| Ansermanuevo | 1 | 4 | 25,0 |
| La Unión | 1 | 18 | 5,6 |
| Palmira | 1 | 669 | 0,1 |
| Total Valle | 10 | 19454 | 0,1 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Brotes de Infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS)

A la semana epidemiológica 37 se han notificado 9 brotes intrahospitalarios.

| Fecha notificación | Municipio | Germen | Servicio | N° casos | Estado actual brote |
|--------------------|-----------|--|---------------------------|----------|---------------------|
| 17/02/2020 | Cali | <i>Candida auris</i> | UCI | 1 | Cerrado |
| 23/01/2020 | Cali | <i>Candida auris</i> | Hospitalización | 1 | Cerrado |
| 24/02/2020 | Tuluá | <i>Clostridium difficile</i> | UCI-Hospitalización | 3 | Cerrado |
| 2/04/2020 | Cali | <i>A. baumannii</i> | Hospitalización pediatría | 1 | Cerrado |
| 5/05/2020 | Cali | <i>Klebsiella pneumoniae</i> | UCI pediatría | 1 | Cerrado |
| 23/06/2020 | Tuluá | <i>Varicela</i> | Urgencias | 3 | Cerrado |
| 18/07/2020 | Cali | <i>Cándida Auris</i> | Hospitalización -UCI | 5 | Abierto ** |
| 19/08/2020 | Cali | <i>Cándida Parasitopsis</i> | Hospitalización | 8 | Abierto ** |
| 15/09/2020 | Cali | <i>Klebsiella pneumoniae Multiresistente</i> | UCI | 3 | Abierto ** |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

*Informe de 24 horas enviado por la institución

**Informe de 24 y 72 horas enviado por la institución

Infecciones de Sitio Quirúrgico

A semana epidemiológica 37 de 2020 se han notificado 138 casos, el 70 % (84 casos) son de instituciones del municipio de Cali, 11% (14 casos) de Palmira, 9% (11 casos) de Tuluá, 2,5% (3 casos) de Roldanillo, (2%) 2 casos de Cartago. Y finalmente, (1%) 1 caso de los municipios Yumbo y La Unión.

El 59% de las infecciones notificadas son superficiales, 21% profundas y 18% órgano-espacio. El tipo de procedimiento con un mayor número de infecciones asociadas fue la cesárea con el 45% de los casos, seguido de la herniorrafia con el 28%, colecistectomía con el 15% y revascularización miocárdica 7%.

Tabla 3. Número de infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos por tipo de procedimiento e infección, semana 36, 2020

| Procedimiento | Superficial | % | Profunda | % | Órgano-Espacio | % | Total |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|------------|
| Cesárea | 39 | 61,9 | 8 | 34,8 | 9 | 45 | 56 |
| Herniorrafia | 17 | 27,0 | 9 | 39,1 | 2 | 10 | 28 |
| Revascularización miocárdica | 5 | 7,9 | 2 | 8,7 | 0 | 7 | 7 |
| Colecistectomía | 2 | 3,2 | 4 | 17,4 | 9 | 45 | 15 |
| Total | 63 | 100 | 23 | 100 | 20 | 100 | 106 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020


7. MICOBACTERIAS

➤ Tuberculosis todas las formas (TBTf)

Hasta la SE 37 se notificaron 1039 casos de TB TF residentes de Valle del Cauca, 83.5% fue TB pulmonar y 16.5% fue TB extrapulmonar; comparado con el año pasado a igual SE hubo una reducción solo del 24,7%.

El análisis de comportamiento inusual de Poisson (ACIP) se identificó que Buga, Florida, Toro y Yumbo tuvo un aumento estadísticamente significativo en la notificación de los casos, diferente a los municipios de Alcalá, Caicedonia, Cali, Cartago, Dagua, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Ginebra, Jamundí, La Cumbre, La Victoria, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá y Zarzal que presentaron un decremento en la notificación, comparado con los cinco años anteriores; igualmente, Valle del Cauca para el País presenta la notificación de TBTf por encima de lo esperado, comparado con la notificación de 5 años anteriores a igual semana epidemiológica.

Gráfico 1. Comportamiento de la notificación de la Tuberculosis, Valle, 2020 semanas epidemiológicas 37 de 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

La Incidencia (casos nuevos) para Valle del Cauca hasta SE 37:

- TBTf 20,6 casos x cada 100.000 habitantes.
- TBTf pulmonar 16,9 casos x 100.000 habitantes.
- TBTf extra pulmonar 3,6 casos x cada 100.000 habitante

Tabla 1. Características del tipo de tuberculosis, condición de ingreso e historia de tratamiento para casos de TBTf. Semanas epidemiológicas 1 –37 de 2020

| Variable | Tipo de caso | Tuberculosis Pulmonar | Tuberculosis Extrapulmonar | Total | % |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----|
| Tipo de caso según ingreso | Confirmado por laboratorio | 718 | 51 | 769 | 74 |
| | Confirmado por clínica | 142 | 116 | 258 | 25 |
| | Confirmado por nexo epidemiológico | 8 | 4 | 12 | 1 |
| Caso según historia de tratamiento | Nuevo | 747 | 161 | 908 | 87 |
| | Previamente tratado | 121 | 10 | 131 | 13 |
| Tota | | 868 | 171 | 1039 | |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ Tuberculosis farmacorresistente (TB FR)

Hasta SE 37 se notificaron 22 casos de TB FR, comparado con el año anterior a igual SE hay una reducción en la notificación de 53.2%. De los casos notificados 50% son casos nuevos.

Indicadores:

Porcentaje de coinfección TB FR: 9% (2 casos)

Incidenia departamental TBFR: 0,25 casos (11 casos nuevos) x cada 100.000 habitantes.

De la semana 1 a la 37 el municipio de Cali fue el municipio que reportó más casos, sin embargo, tiene 1 caso notificados como clasificación en proceso. La siguiente gráfica muestra 20 casos confirmados con algún tipo de resistencia.

Tabla 2. Casos TB FR según tipo de tuberculosis y clasificación de resistencia semanas epidemiológicas 01-37, Valle de Cauca, 2020.

| | | Mono Resistente | MDR | Poli Resistente | Resistente a Rifampicina | XDR En Proceso | Clasificación | Total |
|--------------|------------------|------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Buga | TB pulmonar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | TB extrapulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cali | TB pulmonar | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| | TB extrapulmonar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | Total | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Cartago | TB pulmonar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | TB extrapulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Palmira | TB pulmonar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | TB extrapulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuluá | TB pulmonar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | TB extrapulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VALLE | Total | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| | % | 36 | 27 | 0 | 27 | 5 | 5 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, 2020

➤ **Confección y mortalidad TB-VIH**

Hasta SE 37 se notificaron 141 casos de coinfección TB-VIH, 139 TBTF y 2 TBFR, el porcentaje de confección fue de 13,3% de 1039 casos entre TB sensible y 22 resistente para un total de 1058

Revisando las fuentes de información, por Sivigila (813) y RUAF se han identificado 20 casos notificados mortalidad TB-VIH ≤ 49 años, los 11 casos son residentes del municipio de Cali , 3 Tuluá, 2 casos

de Palmira, uno (1) Darien, uno (1) Buga, uno (1) Dagua y uno (1) en Andalucía.

➤ **Comportamiento de la notificación de lepra, Valle del Cauca, semana 37 de 2020.**

A la semana 37 de 2020, se han notificado (27) casos de Lepra. En la misma Semana de 2019 se presentaron (41) Casos, presentando una reducción 34% comparado con los años anteriores .

De acuerdo al comportamiento de los municipios, a semana 36 de 2020, se han notificado 27 casos de Lepra de los cuales, residentes. en Ansermanuevo (1), San Pedro (1), Cali (17), Tuluá (2), Palmira (2),Candelaria (2),Trujillo (1) y Yotoco (1).

Para el análisis de los comportamientos inusuales se está utilizando como modelo de probabilidad la distribución de Poisson, se identifica que para Lepra hay un Decremento de casos en Dagua, El Cerrito y Florida, pero no estadísticamente significativo, y el municipio de Cali presenta un Incremento estadísticamente significativo, comparado con los 5 años anteriores para igual semanas epidemiológicas.

Indicadores a semana 37 de 2020

- Porcentaje de casos multibacilares: 73.9%
- Porcentaje de discapacidad I y II: 26.1%
- Tasa de discapacidad general: 0,7 x 100.000 habitantes.
- Tasa de Incidencia de casos: 0,52 por 100.000 Habitantes

Tabla 3. Comportamiento por Municipios. Incidencia de Lepra. Valle del Cauca - Semana 37 2020

| Municipios procedencia | Casos | % |
|------------------------|-----------|--------------|
| Ansermanuevo | 1 | 4,0 |
| Cali | 17 | 63,0 |
| Tuluá | 2 | 7,0 |
| Palmira | 2 | 7,0 |
| Candelaria | 2 | 7,0 |
| Trujillo | 1 | 4,0 |
| Yotoco | 1 | 4,0 |
| San Pedro | 1 | 4,0 |
| Total Valle | 27 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

8. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

➤ **Sífilis gestacional**

Hasta la semana 37 hubo 508 casos de residentes en Valle del Cauca (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de sífilis gestacional por municipio de residencia, Valle del Cauca, semana epidemiológica 37 de 2020.

| Municipio de Residencia | No. Casos por municipio de residencia | Nacidos vivos + mortinatos | Razon de prevalencia *1000NV+Mortinatos | % |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|------------|
| ALCALA | 2 | 55 | 36,4 | 0 |
| ANDALUCIA | 1 | 120 | 8,3 | 0 |
| ANSERMANUEVO | 6 | 95 | 63,2 | 1 |
| ARGELIA | 1 | 22 | 45,5 | 0 |
| BUGA | 17 | 838 | 20,3 | 3 |
| BUGALAGRANDE | 1 | 149 | 6,7 | 0 |
| CAICEDONIA | 4 | 88 | 45,5 | 1 |
| CALI | 287 | 17722 | 16,2 | 56 |
| CANDELARIA | 15 | 821 | 18,3 | 3 |
| CARTAGO | 16 | 557 | 28,7 | 3 |
| DAGUA | 7 | 302 | 23,2 | 1 |
| DARIEN | 2 | 138 | 14,5 | 0 |
| ELAGUILA | 3 | 28 | 107,1 | 1 |
| ELCERRITO | 3 | 422 | 7,1 | 1 |
| ELDOVIO | 2 | 101 | 19,8 | 0 |
| FLORIDA | 9 | 487 | 18,5 | 2 |
| GINEBRA | 3 | 126 | 23,8 | 1 |
| GUACARI | 1 | 276 | 3,6 | 0 |
| JAMUNDI | 27 | 1340 | 20,1 | 5 |
| LA CUMBRE | 1 | 67 | 14,9 | 0 |
| LA UNION | 2 | 188 | 10,6 | 0 |
| OBANDO | 2 | 67 | 29,9 | 0 |
| PALMIRA | 28 | 2283 | 12,3 | 6 |
| PRADERA | 5 | 362 | 13,8 | 1 |
| RESTREPO | 2 | 116 | 17,2 | 0 |
| ROLDANILLO | 1 | 233 | 4,3 | 0 |
| SAN PEDRO | 2 | 102 | 19,6 | 0 |
| SEVILLA | 3 | 243 | 12,3 | 1 |
| TORO | 2 | 53 | 37,7 | 0 |
| TULUA | 22 | 1441 | 15,3 | 4 |
| VERSALLES | 2 | 48 | 41,7 | 0 |
| VIJES | 1 | 106 | 9,4 | 0 |
| YUMBO | 27 | 893 | 30,2 | 5 |
| ZARZAL | 1 | 275 | 3,6 | 0 |
| Valle del Cauca | 508 | 30662 | 16,6 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

➤ **Sífilis congénita**

La razón de prevalencia estimada fue de 16,6 casos por cada 1000 nacidos vivos + mortinatos.

Para esta semana, un 34% de los casos no estaba asegurado, seguido de la EAPB Emssanar y Coosalud (Tabla 2).

Tabla 2. Notificación de Casos de Sífilis Gestacional por EAPB, Valle del Cauca, semana epidemiológica 37 de 2020.

| EAPB | No. Casos | % |
|----------------------|------------|------------|
| AIC EPSI | 1 | 0 |
| AMBUQ ESS | 6 | 1 |
| ASMET SALUD | 29 | 6 |
| COMFENALCO | 8 | 2 |
| COOMEVA | 18 | 4 |
| COOSALUD | 47 | 9 |
| EMSSANAR | 110 | 22 |
| FIDUPREVISORA SA RES | 5 | 1 |
| FUERZAS MILITARES | 1 | 0 |
| MEDIMAS | 23 | 5 |
| NO ASEGURADO | 172 | 34 |
| NUEVA EPS | 24 | 5 |
| POLICIA NACIONAL | 2 | 0 |
| SALUD TOTAL SA EPS | 11 | 2 |
| SANITAS EPS SA | 4 | 1 |
| SAVIA SALUD | 1 | 0 |
| SOS EPS | 40 | 8 |
| SURA EPS | 6 | 1 |
| Total Valle | 508 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

De los casos no asegurados, 143 (83,1%), son mujeres migrantes, las 29 (16,9%) restantes, son residentes en el Municipio de Buga, Cali, Candelaria, Cartago, Palmira y Tuluá.

Hasta la semana 37 se observaron 70 casos de residentes en 16 municipios de Valle del Cauca (Tabla 3).

Tabla 3. Comportamiento de la Notificación e Incidencia de Casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Valle del Cauca, semana epidemiológica 37 de 2020.

| Municipio de Residencia | No. Casos por municipio de residencia | Nacidos vivos + mortinatos | Incidencia | % |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| ANDALUCIA | 1 | 120 | 8,3 | 1 |
| BUGA | 12 | 838 | 14,3 | 17 |
| CAICEDONIA | 1 | 88 | 11,4 | 1 |
| CALI | 29 | 17722 | 1,6 | 41 |
| CANDELARIA | 2 | 821 | 2,4 | 3 |
| CARTAGO | 4 | 557 | 7,2 | 6 |
| FLORIDA | 1 | 487 | 2,1 | 1 |
| GUACARI | 3 | 276 | 11 | 4 |
| JAMUNDI | 3 | 1340 | 2,2 | 4 |
| PALMIRA | 6 | 2283 | 2,6 | 9 |
| PRADERA | 1 | 362 | 2,8 | 1 |
| RESTREPO | 2 | 116 | 17,2 | 3 |
| TULUA | 1 | 1441 | 0,7 | 1 |
| VIJES | 2 | 96 | 20,8 | 3 |
| ZARZAL | 2 | 275 | 7,3 | 3 |
| Valle del Cauca | 70 | 30662 | 2,3 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.
*Nacidos vivos y muertos residentes del Valle del Cauca corte semana 9 de 2020-RUAF.

Para la semana 37, de los casos notificados como sífilis congénita, el 40% son no asegurados, seguido por la EAPB Emssanar con un 34% y Coomeva con un 4% (Tabla 4).

Tabla 4. Comportamiento de la Notificación de Casos de Sífilis Congénita por EAPB, Valle del Cauca, semana epidemiológica 37 de 2020.

| EAPB | No. Casos | % |
|--------------------|-----------|------------|
| NO ASEGURADO | 28 | 40 |
| EMSSANAR ESS | 24 | 34 |
| COOMEVA EPS SA | 3 | 4 |
| COOSALUD ESSC | 3 | 4 |
| MEDIMAS EPS | 3 | 4 |
| ASMET SALUD | 2 | 3 |
| AIC EPSI | 1 | 1 |
| AMBUQ ESS | 1 | 1 |
| COMFENALCO VALLI | 1 | 1 |
| NUEVA EPS | 1 | 1 |
| POLICIA NACIONAL | 1 | 1 |
| SANITAS EPS SA | 1 | 1 |
| SOS EPS | 1 | 1 |
| Total Valle | 70 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

De los casos no asegurados, un 64,3% (n= 18), era de hijos de mujeres migrantes, un 35,7% (n= 10) restante de colombianas residentes en los municipios de Cali, Jamundí, Tuluá y Vijes.

➤ VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana 37 hubo 961 casos procedentes de Valle del Cauca; Un 91,9% de ellos fue notificado en estado VIH, 5,4% en como SIDA

y un 2,7% como fallecido. La Tabla 33 relaciona los casos por municipio de procedencia.

Tabla 5. Comportamiento de la Notificación de Casos de VIH/SIDA por Municipio de Procedencia, a semana epidemiológica 37 de 2020, Valle del Cauca.

| Municipio de Procedencia | No. Casos | % |
|--------------------------|------------|------------|
| CALI | 635 | 66 |
| PALMIRA | 69 | 7 |
| TULUA | 57 | 6 |
| BUGA | 42 | 4 |
| CARTAGO | 29 | 3 |
| JAMUNDI | 24 | 2 |
| YUMBO | 21 | 2 |
| FLORIDA | 9 | 1 |
| SEVILLA | 9 | 1 |
| CAICEDONIA | 8 | 1 |
| CANDELARIA | 6 | 1 |
| ZARZAL | 6 | 1 |
| GINEBRA | 5 | 1 |
| ALCALA | 4 | 0 |
| LA VICTORIA | 4 | 0 |
| BUGALAGRANDE | 3 | 0 |
| EL CERRITO | 3 | 0 |
| GUACARI | 3 | 0 |
| ROLDANILLO | 3 | 0 |
| ULLOA | 3 | 0 |
| DARIEN | 2 | 0 |
| LA UNION | 2 | 0 |
| PRADERA | 2 | 0 |
| RIOFRIO | 2 | 0 |
| SAN PEDRO | 2 | 0 |
| TRUJILLO | 2 | 0 |
| ANDALUCIA | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 1 | 0 |
| DAGUA | 1 | 0 |
| OBANDO | 1 | 0 |
| RESTREPO | 1 | 0 |
| TORO | 1 | 0 |
| Total Valle | 961 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Comportamiento de VIH/SIDA en Situaciones Especiales Gestantes

Hasta la semana 37 se notificaron 34 mujeres gestantes que conviven con VIH residentes de los municipios de Alcalá, Buga, Cali, Cartago, Jamundi, Obando, Palmira, Tuluá, Ulloa y Yotoco, de estas 35,3% (n= 12) cumplió con la definición de caso, las restantes están notificadas con carga viral inferior a 5.000 copias y/o pruebas Elisa o pruebas rápidas.

Coinfección TB/VIH

Por la ficha 850 se reportaron 17 casos de mortalidad, de estos tres cumplieron con el criterio de análisis según protocolo del INS como mortalidad por TB/VIH en menor de 49 años de edad.

➤ Hepatitis B.

Hasta la semana 37 hubo 111 casos procedentes de Valle del Cauca (Tabla 6).

Tabla 6. Notificación de casos de hepatitis B y C por municipio de procedencia, Valle del Cauca, semana epidemiológica 37 de 2020

| Municipio de Procedencia | No. Casos | % |
|---------------------------------|------------------|------------|
| CALI | 90 | 81 |
| PALMIRA | 6 | 5 |
| CARTAGO | 3 | 3 |
| BUGA | 2 | 2 |
| JAMUNDI | 2 | 2 |
| YUMBO | 2 | 2 |
| ALCALA | 1 | 1 |
| BUGALAGRANDE | 1 | 1 |
| DAGUA | 1 | 1 |
| EL CERRITO | 1 | 1 |
| LA CUMBRE | 1 | 1 |
| PRADERA | 1 | 1 |
| Total Valle | 111 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Hepatitis B en Situaciones Especiales

Comportamiento de Hepatitis B en Situaciones Especiales Gestantes

Hasta esta semana se ha notificado un caso procedente del municipio de Jamundí.

Coinfección VHB/VIH


Hasta esta semana se notificaron 37 casos procedentes de los municipios de Cali con 28, Yumbo con 2 y, Buga y Cartago, con un caso cada uno.

9. ENFERMEDADES CRÓNICAS

➤ Cáncer en menores de 18 años

A la SEM epidemiológica 37 comprendido desde el 29 de diciembre de 2019 hasta el 12 de Septiembre del año en curso. La Incidencia fue de 9,4 por 100.000 habitantes menores de 18 años Se notificaron 204 casos de cáncer infantil en el Departamento del Valle, de los cuales 57 fueron descartados por duplicación o error de digitación y 34 de otros departamentos, quedando un total de 110 casos. El 95,4 % son nuevos diagnósticos y 5 recaídas.

Gráfico 1. Distribución del cáncer en menores de 18 años según semana Epidemiológica. Valle del Cauca, a semana epidemiológica 37 de 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

En la presente Semana Epidemiológica se presentó 1 solo caso. Desde que comienza el año, se observa un comportamiento homogéneo con picos y valles, situación que se puede explicar por la baja de la consulta atípica en las IPS y por ende en el reporte consecuencia de la pandemia COVID-19, presentando algunos picos en las semanas 20, 21, 23 y 26. Del total de los casos

notificados en este año; 19 cumplen con criterio de ajuste; si bien los tiempos del SIVIGILA son 4 semanas a nivel de indicadores de oportunidad, se cuenta con 8 días para confirmación y así cumplir el indicador de alta oportunidad.

Con relación al diagnóstico, se encontró que “La leucemia Linfocítica Aguda”, “Tumores del sistema nervioso central” y “ otras neoplasias malignas no especificadas” representan el 66,0 % del total de las categorías diagnósticas, ver tabla 1.

Tabla 1. Distribución del cáncer en menores de 18 años según tipo de diagnóstico. Valle del Cauca, la semana epidemiológica 37 de 2020.

| TIPOS DE CÁNCER | CASOS | % |
|--|------------|------------|
| TUMORES HEPATICOS | 1 | 0,9 |
| OTRAS LEUCEMIAS | 2 | 1,8 |
| TUMORES GERMINALES, TROFOBLASTICOS Y OTROS GONADALES | 3 | 2,7 |
| LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA | 3 | 2,7 |
| TUMORES RENALES | 3 | 2,7 |
| TUMORES OSEOS MALIGNOS | 4 | 3,6 |
| RETINOBLASTOMA | 5 | 4,5 |
| LINFOMAS Y NEOPLASIAS RETICULOENDOTELIALES | 6 | 5,5 |
| SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS Y INTRAÓSEOS | 7 | 6,4 |
| OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS NO ESPECIFICADAS | 13 | 11,8 |
| TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 21 | 19,1 |
| LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA | 42 | 38,2 |
| TOTAL | 110 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020


El 94,3% se encontraban afiliados al sistema de seguridad social al momento de la presunción diagnóstica, siendo el régimen contributivo el de mayor número de caso con el 55,4% (61/110), seguido del subsidiado con el 36,3% (40/110) y en la población no asegurada fue del 5,4% (6/110). Los Municipios diferentes a Cali durante esta

semana acumularon el 30,1% (34/110) de los casos; Cali aportó el 69,0% (76/110) del total de casos en el Valle del Cauca. Durante este periodo el 39,0,5% (16/41) de los municipios del Valle Cauca notificaron casos.

➤ **Cáncer de mama**

Se observa que hasta la semana epidemiológica 37, han ingresado al SIVIGILA 638 casos de CA de mama para una incidencia de 34,3 casos por cada 100.000 habitantes, de los casos notificados, después de haber depurado la información salieron 41 casos repetidos, 12 descartados por ajuste 6 y D, y 52 casos de otros dptos y municipios. Se presentaron 2 reportes en población masculina. Cabe aclarar que este evento no vigila la prevalencia, busca identificar los casos nuevos del año en curso.

Gráfica 2. Comportamiento en la notificación de cáncer de mama, Valle del Cauca por año y semana epidemiológica 1-37, 2018-2019-2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2018- 2020

En la semana epidemiológica 37 de 2020, correspondiente al periodo 10 , han ingresado notificados al SIVIGILA 34 casos confirmados de cáncer de mama; a la misma semana del 2019 y 2018 se notificaron

14 y 18 casos respectivamente, se presentó una disminución desde la semana epidemiológica 9 hasta la presente, situación que se puede explicar por la baja en la consulta y por ende su notificación reportada después de marzo por la pandemia Covid 19, repuntando un significativo aumento en las tres últimas semanas. Se reportaron el 67,5% (431/638) casos régimen contributivo ocupando el primer lugar seguido de régimen subsidiado con el 28,2% (180/638); la población No Asegurada fue del 2.3% (15/638) situación que amerita intervención inmediata por aseguramiento con la gestion de Programa. El total de la población asegurada fue del 97,6% (gráfica 3).

Gráfica 3. Comportamiento en la notificación de cáncer de mama, Valle del Cauca por el Municipio. Semana epidemiológica 1-37, 2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Se ha recibido notificación de CA de mama de 31 municipios del Valle del Cauca, 75,6% (31/41) registrando la mayor notificación por residencia: Cali, seguido de Palmira, Cartago, Tuluá y Jamundi; esto, registraron el mayor número de casos con Cali registrando el mayor número de casos, concentrando el 86,7% . Cali aporta el 68,5% de estos. No se ha tenido en cuenta casos procedentes de Buenaventura por ser Distrito. (gráfica 2).

➤ **Cáncer de cérvix**

Se observa que hasta la semana epidemiológica 37, han ingresado al SIVIGILA 299 casos de CA de Cérvix para una incidencia de 16,1 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 18 años en el 2020. , de los casos notificados, después de haber depurado la información salieron 4 casos descartados por ajuste 6 y D, 21 repetidos y 28 casos de otros Dptos y Municipios.(Gráfica 4)


Gráfica 4. Comportamiento en la notificación de cáncer de cérvix, Valle del Cauca, por año y semana epidemiológica 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

En la semana epidemiológica 37 de 2020, correspondiente al periodo epidemiológico 10 , han ingresado notificados al SIVIGILA 14 casos confirmados de Cáncer de Cérvix, Del total de los casos notificados en este año; 21 cumplen con criterio de ajuste. A la misma semana del 2019 y 2018 se notificaron 10 y 0 casos respectivamente. Se observa un aumento considerable en las semanas 7 y 8 del presente año y una disminución paulatina en las siguientes semanas con ligero aumento en las últimas semanas, posiblemente explicado por la baja de consulta derivada de la pandemia Covid 19 y el repunte en las últimas semanas por la apertura del aislamiento (Gráfica 5).

Gráfica 5. Comportamiento en la notificación de cáncer de cérvix, Valle del Cauca por el Municipio. Semana epidemiológica 1-36,2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020


El 98% se encontraban afiliados al sistema de seguridad social al momento de la Notificación o diagnóstico, siendo el régimen contributivo el de mayor número de casos 56,2% (168/299) seguido de subsidiado con 40,4% (121/299). Se reportaron el 2,0% de casos no asegurados (6/199), situación que amerita intervención inmediata por aseguramiento con la gestión del Programa. Durante este periodo el 58,5% (24/41) de los municipios del Valle Cauca presentaron casos, se ha recibido la mayor notificación del municipio de Cali con 68,6% de CA de Cervix, seguido de Palmira y Cartago; registraron entre los tres el mayor número de casos, concentrados en el 81,6% (244/299) No se ha tenido en cuenta casos procedentes de Buenaventura por ser Distrito. (gráfica 2).

➤ **Lesiones por pólvora pirotécnica**

Se registraron 50 lesionados por pólvora pirotécnica. Entre las características de los lesionados se encuentran que 30% fueron menores de edad; los artefactos pirotécnicos determinados como “otros” como las papeletas que generaron 40,4% de los lesionados; la manipulación y la observación de los elementos pirotécnicos fueron

las actividades más frecuentes de los lesionados. Finalmente, las quemaduras fueron la mayor lesión que tuvo la población seguida de las laceraciones. El siguiente mapa evidencia la tasa de incidencia de lesiones por municipio.

Mapa 1. Comportamiento de Pólvora por municipio de residencia Valle hasta Semana 37 de 2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ Enfermedades huérfanas

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2020, una vez realizada la depuración de información eliminando los casos residentes en el Distrito de Buenaventura, los duplicados, los descartados (D y 6) y los residentes de fuera del departamento, se observan 1171 casos de enfermedades huérfanas residentes de Valle del Cauca.

De la totalidad de casos se observa que el 66,4% (743) reside en Cali, seguido de Palmira con un 5,8% (65), se presenta mayor número de casos en mujeres (54,2% n=635) y casos en todos los grupos de edad de 0 a 65 años y más, con mayor porcentaje en el grupo de 5 a 9 años (16,6% n=194) seguido del grupo de 65 años y más (12,4% n=145).

Gráfica 1. Comportamiento de la notificación de casos de Enfermedades huérfanas, semana epidemiológica 38-2020, Valle del Cauca.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

En la siguiente tabla se evidencian las Enfermedades Huérfanas – Raras más frecuentes en la notificación discriminada por rango de edad mayor o menor de 18 años, que corresponden al 36,4% del total de la notificación.

10. VIGILANCIA NUTRICIONAL

➤ **Bajo Peso al Nacer a Término.**

Durante la SE 37, se notificaron 11 casos de bajo peso al nacer a término residentes en el Valle del Cauca; hasta esta SE el porcentaje del departamento fue de 2,34%; 36 municipios presentaron casos, de ellos 19 superaron el promedio departamental. Entre los municipios con mayor número de casos se encuentran Cali, Palmira y Tuluá.

Tabla 1. BPNT acorde al municipio de residencia de la madre. Semana epidemiológica 1- 37 de 2020.

| Municipio | BPNT | NV | % |
|--------------|------|-------|------|
| Alcalá | 4 | 55 | 7,27 |
| Ansermanuevo | 3 | 94 | 3,19 |
| Bolívar | 5 | 88 | 5,68 |
| Buga | 28 | 821 | 3,41 |
| Bugalagrande | 2 | 144 | 1,39 |
| Caicedonia | 2 | 86 | 2,33 |
| Cali | 448 | 16339 | 2,74 |
| Candelaria | 23 | 771 | 2,98 |
| Cartago | 13 | 533 | 2,44 |
| Dagua | 7 | 283 | 2,47 |
| Darién | 3 | 135 | 2,22 |
| El Cerrito | 8 | 402 | 1,99 |
| El Dovio | 3 | 99 | 3,03 |
| Florida | 13 | 460 | 2,83 |
| Guacarí | 9 | 270 | 3,33 |
| Jamundí | 32 | 1265 | 2,53 |
| La Cumbre | 1 | 65 | 1,54 |
| La Unión | 3 | 184 | 1,63 |
| La Victoria | 1 | 53 | 1,89 |
| Obando | 3 | 61 | 4,92 |
| Palmira | 43 | 2203 | 1,95 |
| Pradera | 11 | 348 | 3,16 |
| Restrepo | 3 | 115 | 2,61 |
| Riofrío | 1 | 90 | 1,11 |
| Roldanillo | 4 | 230 | 1,74 |
| San Pedro | 1 | 97 | 1,03 |
| Sevilla | 2 | 239 | 0,84 |
| Toro | 1 | 52 | 1,92 |
| Trujillo | 2 | 121 | 1,65 |
| Tuluá | 37 | 1400 | 2,64 |

Tabla 1. Proporción de las diez Enfermedades Huérfanas notificadas con mayor frecuencia según rango de edad, semana epidemiológica 37-2020, Valle del Cauca.

| Enfermedad huérfana | Mayor de 18 años | Menor de 18 años | Total | % total |
|--|------------------|------------------|-------|---------|
| Esclerosis Múltiple | 101 | 0 | 101 | 8,6251 |
| Drepanocitosis | 58 | 1 | 59 | 4,9530 |
| Enfermedad de Von Willebrand | 58 | 0 | 58 | 4,9530 |
| Displasia broncopulmonar | 4 | 48 | 52 | 0,3416 |
| Déficit congénito del factor VIII | 50 | 0 | 50 | 4,2699 |
| Miastenia grave | 34 | 0 | 34 | 2,9035 |
| Esclerosis múltiple - ictiosis - deficiencia del factor VIII | 26 | 0 | 26 | 2,2203 |
| Enfermedad de Crohn | 25 | 0 | 25 | 2,1349 |
| Síndrome de Guillain-Barre | 25 | 0 | 25 | 2,1349 |
| Hepatitis crónica autoinmune | 25 | 0 | 25 | 2,1349 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Hasta la semana epidemiológica 37, ha ingresado una alerta semanal en menor de 1 año, SE 12 caso de drepanocitosis, remitido a la EPS para seguimiento.

| | | | |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Ulloa | 1 | 8 | 12,50 |
| Versalles | 1 | 45 | 2,22 |
| Vijes | 3 | 87 | 3,45 |
| Yotoco | 5 | 101 | 4,95 |
| Yumbo | 12 | 835 | 1,44 |
| Zarzal | 2 | 269 | 0,74 |
| Total general | 740 | 31674 | 2,35 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

En cuanto al comportamiento sociodemográfico, el 90,4 % de los casos de BPNT se registró en niños residentes en el área de la Cabecera Municipal; el 48,9% se registró en el régimen contributivo, el 94,7 %, se notificó en niños con pertenencia étnica “otros”; el 54,6% de los casos se presentaron en el género Femenino.

Tabla 2. Comportamiento sociodemográfico de los casos de BPNT en el Valle del Cauca, Semanas epidemiológicas, 1-37 de 2020.

| Variable | Categoría | Total | % |
|-----------------------------|--------------------|-------|------|
| Área De Ocurrencia Del Caso | Cabecera Municipal | 669 | 90,4 |
| | Centro Poblado | 34 | 4,6 |
| | Rural Disperso | 37 | 5,0 |
| Seguridad Social | Contributivo | 362 | 48,9 |
| | Especial | 1 | 0,1 |
| | Indeterminado | 6 | 0,8 |
| | No Asegurado | 84 | 11,4 |
| | Excepción | 4 | 0,5 |
| | Subsidiado | 280 | 37,8 |
| Etnia | Indígena | 7 | 0,9 |
| | Rom, Gitano | 2 | 0,3 |
| | Raizal | 1 | 0,1 |
| | Palenquero | 2 | 0,3 |
| | Negro | 27 | 3,6 |
| | Otro | 701 | 94,7 |
| Género | Femenino | 404 | 54,6 |
| | Masculino | 332 | 44,9 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

➤ **Desnutrición Aguda Moderada y severa en menores de 5 años.**

Durante la SE 37, se notificaron 4 casos residentes en el Valle del Cauca. Hasta la SE 37 fueron notificados 354 casos, de los cuales el mayor número corresponde al municipio de Cali, seguido de los municipios de Yumbo, Palmira. El 59,2 % de los municipios presentan casos (25/42); se evidencia un decremento en la notificación de los casos en el departamento con respecto al año anterior.

Tabla 3. Desnutrición aguda en menores de 5 años por municipio de residencia. Semana epidemiológica 1- 37 de 2020.

| Municipio | Nº de casos | % |
|--------------|-------------|------------|
| Andalucía | 4 | 1,13 |
| Bolívar | 2 | 0,56 |
| Buga | 8 | 2,26 |
| Caicedonia | 5 | 1,13 |
| Cali | 239 | 65,82 |
| Candelaria | 4 | 1,13 |
| Cartago | 1 | 0,28 |
| Dagua | 1 | 0,28 |
| El Aguila | 3 | 0,85 |
| El Cairo | 2 | 0,56 |
| El Dovio | 4 | 1,13 |
| Florida | 14 | 3,67 |
| Guacarí | 1 | 0,28 |
| Jamundí | 8 | 1,98 |
| La Unión | 1 | 0,28 |
| Obando | 4 | 0,56 |
| Palmira | 22 | 6,21 |
| Pradera | 5 | 1,13 |
| Roldanillo | 2 | 0,56 |
| Toro | 4 | 1,13 |
| Tuluá | 3 | 0,85 |
| Ulloa | 1 | 0,28 |
| Vijes | 3 | 0,85 |
| Yumbo | 28 | 6,78 |
| Zarzal | 1 | 0,28 |
| TOTAL | 354 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

En cuanto al comportamiento sociodemográfico, se observa que el 90,7 % de los casos de Desnutrición Aguda se registró en niños residentes en el área de la Cabecera Municipal; el 54,5 % se registró en el régimen subsidiado, el 88 %, se notificó en niños con pertenencia étnica “otros”; el 59,6 % se notificó en niños entre 1 a 5 años; el 50,3 % de los casos se presentaron en el género Femenino.

Tabla 4. Comportamiento sociodemográfico de los casos de Desnutrición Aguda en el Valle del Cauca, Semanas epidemiológicas, 1-37 de 2020

| Variable | Categoría | Total | % |
|-----------------------------|--------------------|-------|------|
| Área De Ocurrencia Del Caso | Cabecera Municipal | 321 | 90,7 |
| | Centro Poblado | 8 | 2,3 |
| | Rural Disperso | 25 | 7,1 |
| Seguridad Social | Contributivo | 120 | 33,9 |
| | Indeterminado | 1 | 0,3 |
| | No Asegurado | 39 | 11,0 |
| | Excepción | 1 | 0,3 |
| | Subsidiado | 193 | 54,5 |
| Etnia | Indígena | 9 | 2,5 |
| | Rom, Gitano | 1 | 0,3 |
| | Negro | 33 | 9,3 |
| | Otro | 311 | 87,9 |
| Género | Femenino | 178 | 50,3 |
| | Masculino | 176 | 49,7 |
| Grupo De Edad | Menor De 1 Año | 143 | 40,4 |
| | De 1 A 5 años | 211 | 59,6 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

Durante la semana 37 no se notificaron casos de alerta inmediata, en el departamento del Valle del Cauca. *.(Casos con Perímetro Braquial < 11.5cm en niños de 6 a 59 meses)*

Los municipios como Andalucía, Buga, Toro, Ulloa y Yumbo presentan un aumento estadísticamente significativo.

11. MORTALIDAD INFANTIL INTEGRADA

Hasta la semana 37, se notificaron 33 muertes en menores de 5 años: 17 probablemente asociadas a infección respiratoria aguda, 6 a enfermedad diarreica aguda y 10 a desnutrición; 9 del Distrito de Buenaventura (IRA: 5 casos, EDA: 2, Desnutrición: 2) y 24 casos se notificaron con residencia Valle excluyendo Buenaventura (IRA: 11 casos, EDA: 4, Desnutrición: 9).

Tabla 1. Notificación de mortalidad en menores de 5 años, Valle del Cauca, Semana epidemiológica 37, 2018-2020 (No incluye a Buenaventura).

| Evento priorizado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|
| MORTALIDAD POR DNT | 6 | 11 | 3 | 9 |
| MORTALIDAD POR EDA | 4 | 6 | 4 | 4 |
| MORTALIDAD POR IRA | 19 | 21 | 24 | 11 |
| Total | 29 | 38 | 31 | 24 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020

Hasta la semana 37, la razón de mortalidad infantil en niños menores de 5 años por causa de IRA, EDA y Desnutrición para el Valle del Cauca, sin Buenaventura, fue de 0,79 casos por cada 1000 nacidos vivos (meta: tasa de mortalidad infantil menores de 5 años menos de 11,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos) y la tasa de mortalidad en menores de 5 años fue de 7 casos por 100.000 menores de 5 años.

➤ Mortalidad por Desnutrición.

Hasta la semana 37 se notificaron 9 casos probables de muerte por y asociada a desnutrición en menores de 5 años. Con corte a la misma semana de 2019, se habían notificado 3 casos, lo que representa un incremento del 60 %. La tasa de mortalidad en menores de 5 años por Desnutrición es de 3 casos por 100.000 menores de 5 años (meta: 1,32 muertes por 100.000 hab); Por residencia los municipios que registraron casos de mortalidad en menores de 5 años por

desnutrición sin incluir el Distrito de Buenaventura fueron Cali y Yumbo con dos casos, Bolívar, Cali, Cartago, El Dovio, Jamundí y Palmira con 1 caso cada uno; El municipio que presentó la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años más alta en el departamento fue El Dovio con 123,3 casos por 100.000 menores de cinco años, seguido de Bolívar con 72,4 casos por 100.000 menores de cinco años. Respecto a las muertes acumuladas a semana epidemiológica 36 se observó no diferencias significativas en el número de casos en comparación con el histórico notificado en el mismo periodo 2015 a 2019.

Tabla 2. Notificación de Mortalidad infantil por Desnutrición por Municipio de residencia, Valle, Semana epidemiológica 37 de 2020.

| Municipio Residencia | Total | Proyección DANE niños Menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años por 100.000 | % |
|----------------------|----------|---|--|--------------|
| BOLIVAR | 1 | 1381 | 72 | 11,1 |
| CALI | 2 | 157990 | 1 | 22,2 |
| CARTAGO | 1 | 8991 | 11 | 11,1 |
| EL DOVIO | 1 | 811 | 123 | 11,1 |
| JAMUNDI | 1 | 12481 | 8 | 11,1 |
| PALMIRA | 1 | 25653 | 4 | 11,1 |
| YUMBO | 2 | 8378 | 24 | 22,2 |
| Total general | 9 | 303461 | 3 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020, DANE-Proyección Censo 2018

➤ Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda

Hasta la semana 37, se notificaron 4 casos de muerte por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, Para la misma semana de 2019 se notificaron 4 casos; la tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA es de 1,6 casos por 100.000 hab (meta: 1,32 muertes por 100.000 hab); Por procedencia los municipios que registraron casos de mortalidad en menores de 5 años por EDA sin incluir el Distrito de Buenaventura fueron Cali con dos casos , Buga y Florida con 1 caso cada uno, El municipio que presentó la tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años más alta en el departamento fue Florida con 21,7 casos por 100.000 menores de cinco años.

Tabla 3. Notificación de Mortalidad infantil por EDA por Municipio de residencia, Valle, Semana epidemiológica 37 de 2020.

| Municipio Residencia | Total | Proyección DANE niños menores de 5 años por 100.000 | Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años por 100.000 | % |
|----------------------|----------|---|--|------------|
| BUGA | 1 | 9330 | 10,7 | 25 |
| CALI | 2 | 157990 | 1,3 | 50 |
| FLORIDA | 1 | 4610 | 21,7 | 25 |
| Total general | 4 | 303461 | 1,3 | 100 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020, DANE-Proyección Censo 2018

Respecto a las muertes acumuladas a semana epidemiológica 36 se observó no diferencias significativas en el número de casos en comparación con el histórico notificado en el mismo periodo 2015 a 2019

➤ **Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda**

Se notificaron 11 casos de muerte por infección respiratoria aguda en menores de 5 años; Para la misma semana de 2019 se notificaron 24 casos, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA a semana 35 es de 3,6 casos por 100.000 menores de 5 años (meta: 12,40 muertes por 100.000 hab); Por residencia los municipios que registraron casos de mortalidad en menores de 5 años por IRA sin incluir el Distrito de Buenaventura fueron: Cali 7 casos (63 %), Palmira 2 casos (18 %), Buga con 1 caso (9%) y Tuluá 1 caso (9%), El municipio que presentó la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años más alta en el departamento fue Buga con 10.7 casos por 100.000 menores de cinco años.

Tabla 4. Notificación de Mortalidad infantil por IRA por Municipio de residencia, Valle, Semana epidemiológica 37 de 2020

| Municipio | No | Proyección DANE niños menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años | % |
|----------------------|-----------|---|--|--------------|
| BUGA | 1 | 9330 | 10,7 | 9,1 |
| CALI | 7 | 157990 | 4,4 | 63,6 |
| PALMIRA | 2 | 25653 | 7,8 | 18,2 |
| TULUA | 1 | 15745 | 6,4 | 9,1 |
| Total general | 11 | 303461 | 3,6 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020, DANE-Proyección Censo 2018

Respecto a las muertes acumuladas a semana epidemiológica 3 se observó una disminución en el número de casos en comparación con el histórico notificado en el mismo periodo 2015 a 2019.

12. MATERNIDAD SEGURA

➤ **Mortalidad materna (MM)**

Hasta la semana 37, se notificaron 29 casos de Muerte materna, 5 casos residentes del departamento del Cauca, 3 del departamento de Nariño , 3 del Distrito de Buenaventura (mortalidad temprana) y 18 con residencia Valle (excluyendo Buenaventura); 10 casos corresponden a muerte materna temprana (las que ocurren durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación), 6 casos corresponden a muerte materna tardía (las que ocurren desde el día 43 y hasta un año de terminada la gestación); y dos casos correspondiente a lesión de causa externa.

Tabla 1. Notificación de mortalidad materna, Valle del Cauca, Semana epidemiológica 37, 2018-2020 (No incluye a Buenaventura).

| Año | 2018 | 2019 | 2020 | % incremento/decremento |
|-------------|------|------|------|-------------------------|
| Temprana | 3 | 11 | 10 | -10 |
| Tardía | 4 | 8 | 6 | -33 |
| Coincidente | 9 | 2 | 2 | 0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020, Ruaf Estadísticas Vitales-2020 p

Hasta la semana 37, la razón de mortalidad materna para el Valle del Cauca, sin Buenaventura, fue de 42 casos por cada 100.000 nacidos vivos (meta: razón de mortalidad materna a 32 por cada 100.000 nacidos vivos). El municipio que presentó la razón de mortalidad materna temprana más alta en el departamento fue Andalucía con 877 casos por 100.000 nacidos vivos.

Tabla 2. Notificación de Mortalidad Materna por Municipio de residencia, Valle, Semana epidemiológica 37 de 2020

| MUNICIPIO RESIDENCIA | Temprana | Tardía | Coinciden te | Total general | Nacidos Vivos corte sept 18 | Razón de MM por 100.000 nv |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ANDALUCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 | 877 |
| CALI | 7 | 1 | 2 | 10 | 16339 | 43 |
| CARTAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 16339 | 12 |
| DAGUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 283 | 353 |
| FLORIDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 460 | 0 |
| PRADERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 348 | 0 |
| SEVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 239 | 0 |
| TULUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1400 | 0 |
| YOTOCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 |
| ZARZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 269 | 372 |
| Total general | 12 | 6 | 2 | 20 | 28748 | 42 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020
Ruaf Estadísticas Vitales-2020 p

A corte de semana 37, de acuerdo con el promedio de los periodos históricos en los 5 años previos, se observa un incremento en la notificación, el municipio de Cali tiene un incremento en la notificación con respecto a su comportamiento para el mismo periodo de tiempo (Ver tablero de mando). Por causas agrupadas de mortalidad materna temprana hasta la semana epidemiológica 37 de 2020, el 58 % de las muertes maternas tempranas corresponden a causas directas, el 41 % a causas indirectas, la mayor proporción de muertes maternas tempranas corresponde a Complicaciones Hemorrágicas y pre eclampsia severa con el 25 % de los casos, respecto a la mortalidad materna tardía, el 100% de los casos de mortalidad materna corresponden a causas indirectas.

Tabla 3. Mortalidad Materna por tipo y causa principal agrupada, Valle del Cauca (Sin incluir el Distrito de Buenaventura), Semanas epidemiológica 37 ,2020.

| Tipo | Clasificación | Diagnóstico | No |
|----------|---------------|-----------------------------------|----|
| Temprana | Directa | Aborto Séptico | 1 |
| | | Choque Hemorrágico | 3 |
| | | Pre eclampsia Severa | 3 |
| | Indirecta | COVID 19 (en estudio) | 2 |
| | | Neoplasia Intra Abdominal | 1 |
| | | Tromboembolismo pulmonar | 2 |
| Tardía | Indirecta | A estudio | 1 |
| | | Cáncer en cuello uterino avanzado | 1 |
| | | Dengue grave | 1 |
| | | Enfermedad Cerebro Vascular | 1 |
| | | LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO | 2 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud, Valle del Cauca, 2020

➤ Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía (MP)

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2020 se notificaron 471 muertes perinatales y neonatales tardías; de las cuales 373 son de residencia Valle (excluyendo a Buenaventura); Con corte a la misma semana de 2019, se habían notificado 387 casos, lo que representa un decremento del 8 % (30 casos menos).

Según el momento de ocurrencia, 161 casos (43 %) corresponden a muertes fetales ante parto, 62 casos (17 %) a muertes fetales intraparto, 89 casos (24 %) a muertes neonatales tempranas, 61 casos (16 %) a muertes neonatales tardías.

De acuerdo con las causas de muerte agrupadas, se observó la mayor proporción en: causa mal definida con el 43,2 % (Meta menos del 20%), seguido de embarazo parto y puerperio con el 14,5 % siendo las causas de esta clasificación: parto prematuro, sufrimiento fetal.

Tabla 4. Proporción de causas de muertes perinatales y neonatales tardías agrupadas, Colombia, semana epidemiológica 37 de 2020.

| No | Causas Agrupadas | No | % |
|----|--|-----|------|
| 1 | Causa Mal definida | 161 | 43,2 |
| 2 | Embarazo parto y puerperio | 54 | 14,5 |
| 3 | Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer | 39 | 10,5 |
| 4 | Trastornos respiratorios específicos del período perinatal | 35 | 9,4 |
| 5 | Malformaciones congénitas | 24 | 6,4 |
| 6 | Todas las demás afecciones originadas en el período perinatal | 12 | 3,2 |
| 7 | Infecciones específicas del período perinatal Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento | 10 | 2,7 |
| 8 | | 9 | 2,4 |
| 9 | Enfermedades isquémicas del corazón | 5 | 1,3 |
| 10 | Trastornos de los órganos genitales | 3 | 0,8 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020.

El municipio de Buga y Dagua, tienen un incremento en la notificación con respecto a su comportamiento para el mismo periodo de tiempo (Ver tablero de mando). La razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía para el Departamento del Valle a semana 37 fue de 13 por cada 1000 nacidos vivos. En la siguiente tabla se evidencia el indicador por municipio.

Tabla 5. Tasa de Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía, por entidad territorial de residencia, Valle del Cauca, Semana epidemiológica 37 de 2020.

| MUNICIPIO RESIDENCIA | Total | Nacidos vivos corte sept 18 | Razón de mprnt por 1000 nv | % |
|----------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| ALCALÁ | 2 | 55 | 36 | 0,5 |
| ANDALUCÍA | 1 | 114 | 9 | 0,3 |
| ARGELIA | 1 | 21 | 48 | 0,3 |
| BUGA | 8 | 821 | 10 | 2,1 |
| BUGALAGRANDE | 4 | 144 | 28 | 1,1 |
| CAICEDONIA | 1 | 86 | 12 | 0,3 |
| CALI | 222 | 16339 | 14 | 59,5 |
| CANDELARIA | 11 | 771 | 14 | 2,9 |
| CARTAGO | 7 | 533 | 13 | 1,9 |
| DAGUA | 3 | 283 | 11 | 0,8 |
| EL CERRITO | 3 | 402 | 7 | 0,8 |
| EL DOVIO | 2 | 99 | 20 | 0,5 |
| FLORIDA | 4 | 460 | 9 | 1,1 |
| GINEBRA | 1 | 111 | 9 | 0,3 |
| GUACARÍ | 3 | 270 | 11 | 0,8 |
| JAMUNDÍ | 17 | 1265 | 13 | 4,6 |
| LA CUMBRE | 1 | 65 | 15 | 0,3 |
| LA UNIÓN | 2 | 184 | 11 | 0,5 |
| PALMIRA | 28 | 2203 | 13 | 7,5 |
| PRADERA | 3 | 348 | 9 | 0,8 |
| RESTREPO | 1 | 115 | 9 | 0,3 |
| ROLDANILLO | 3 | 230 | 13 | 0,8 |
| SAN PEDRO | 2 | 97 | 21 | 0,5 |
| SEVILLA | 4 | 239 | 17 | 1,1 |
| TORO | 2 | 52 | 38 | 0,5 |
| TRUJILLO | 1 | 121 | 8 | 0,3 |
| TULUÁ | 20 | 1400 | 14 | 5,4 |
| ULLOA | 1 | 8 | 125 | 0,3 |
| VIJES | 3 | 87 | 34 | 0,8 |
| YOTOCO | 2 | 101 | 20 | 0,5 |
| YUMBO | 7 | 835 | 8 | 1,9 |
| ZARZAL | 3 | 269 | 11 | 0,8 |
| Total general | 373 | 28748 | 13 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020. Estadísticas Vitales, SSD Valle, 2020 p.

Las Aseguradoras con mayor notificación de casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía en el departamento fueron: Emssanar (26), Población No Asegurada (14 %), SOS (10), Nueva EPS y Medimás (8%).

➤ **Morbilidad Materna Extrema (MME)**

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2020 se notificaron 1693 casos, de ellas 1321 residentes en Valle del Cauca (sin Buenaventura). Se observa un incremento de 6 % en la notificación con respecto al año 2019. Los municipios de Caicedonia, Guacarí, La Cumbre y Roldanillo tuvieron un incremento significativo en la notificación con respecto a su comportamiento para el mismo periodo de tiempo (Ver tablero de mando). La razón de MME general en Valle del Cauca fue de 46 casos por cada 1.000 nacimientos. En la siguiente tabla se evidencia el indicador por municipio.

Tabla 6. Tasa de Morbilidad Materna Extrema, por entidad territorial de residencia en Valle del Cauca, Semana epidemiológica 01-37 de 2020.

| MUNICIPIO RESIDENCIA | Total | Nacidos vivos corte sept de 2020 | Razón de MME por 1000 nv | % |
|----------------------|-------|----------------------------------|--------------------------|------|
| ALCALÁ | 6 | 55 | 109,1 | 0,5 |
| ANDALUCÍA | 5 | 114 | 43,9 | 0,4 |
| ANSERMANUEVO | 5 | 94 | 53,2 | 0,4 |
| BUGA | 20 | 821 | 24,4 | 1,5 |
| BUGALAGRANDE | 5 | 144 | 34,7 | 0,4 |
| CAICEDONIA | 6 | 86 | 69,8 | 0,5 |
| CALI | 897 | 16339 | 54,9 | 67,9 |
| CANDELARIA | 26 | 771 | 33,7 | 2,0 |
| CARTAGO | 19 | 533 | 35,6 | 1,4 |
| DAGUA | 11 | 283 | 38,9 | 0,8 |
| DARIEN | 1 | 135 | 7,4 | 0,1 |
| EL CAIRO | 2 | 26 | 76,9 | 0,2 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| EL CERRITO | 9 | 402 | 22,4 | 0,7 |
| EL DOVIO | 3 | 99 | 30,3 | 0,2 |
| FLORIDA | 32 | 460 | 69,6 | 2,4 |
| GINEBRA | 2 | 111 | 18,0 | 0,2 |
| GUACARÍ | 10 | 270 | 37,0 | 0,8 |
| JAMUNDÍ | 64 | 1265 | 50,6 | 4,8 |
| LA CUMBRE | 11 | 65 | 169,2 | 0,8 |
| LA UNIÓN | 2 | 184 | 10,9 | 0,2 |
| LA VICTORIA | 1 | 53 | 18,9 | 0,1 |
| OBANDO | 2 | 61 | 32,8 | 0,2 |
| PALMIRA | 53 | 2203 | 24,1 | 4,0 |
| PRADERA | 17 | 348 | 48,9 | 1,3 |
| RESTREPO | 1 | 115 | 8,7 | 0,1 |
| RIOFRÍO | 2 | 90 | 22,2 | 0,2 |
| ROLDANILLO | 5 | 230 | 21,7 | 0,4 |
| SAN PEDRO | 2 | 97 | 20,6 | 0,2 |
| SEVILLA | 14 | 239 | 58,6 | 1,1 |
| TRUJILLO | 2 | 121 | 16,5 | 0,2 |
| TULUÁ | 38 | 1400 | 27,1 | 2,9 |
| ULLOA | 1 | 8 | 125,0 | 0,1 |
| VERSALES | 3 | 45 | 66,7 | 0,2 |
| YOTOCO | 2 | 101 | 19,8 | 0,2 |
| YUMBO | 33 | 835 | 39,5 | 2,5 |
| ZARZAL | 9 | 269 | 33,5 | 0,7 |
| Total general | 1321 | 28748 | 46,0 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, Colombia 2020. Estadísticas Vitales, SSD Valle, Corte 2020.

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema, hasta la semana epidemiológica 37 de 2020 la mayor proporción corresponden a trastornos hipertensivos con el 71,4 % de los casos.

Tabla 7. Morbilidad materna extrema por causa principal agrupada, Valle del Cauca, semanas epidemiológicas 37, 2020.


| MUNICIPIO RESIDENCIA | No | % |
|---|-------------|--------------|
| Complicaciones de Aborto | 9 | 0,7 |
| Complicaciones Hemorrágicas | 167 | 12,6 |
| Enfermedad Preexistente que se complica | 26 | 2,0 |
| Otra Causa | 24 | 1,8 |
| Sepsis de Origen No Obstétrico | 4 | 0,3 |
| Sepsis de Origen Obstétrico | 140 | Gráf10,6 |
| Sepsis de Origen Pulmonar | 5 | 0,4 |
| Trastornos Hipertensivos | 946 | 71,6 |
| Total general | 1321 | 100,0 |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud, Valle del Cauca, 2020

Las Aseguradoras con mayor notificación de casos de MME en el departamento fueron: SOS (21 %), Emssanar (18 %), Nueva EPS (11 %), PPNA (7 %), Sanitas (5 %).

➤ Defectos Congénitos (DC)

Gráfico 1. Defectos congénitos por semana epidemiológica, Valle del Cauca; 2019 - 2020.



Fuente: Sivigila, Secretaria de Salud Departamental, Valle del Cauca 2019

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2020, se notificaron 860 casos de defectos congénitos, una vez realizada la depuración de información, se observa un total de 603 casos residentes en el Departamento del Valle del Cauca.


La prevalencia a semana epidemiológica 37 es de 190.4 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Con respecto a los Municipios de Departamento, la prevalencia más alta la tiene el Municipio de El Cairo (769 casos por 10000 nacidos vivos), La Cumbre (307 casos por 10000 nacidos vivos), Cartago (262 casos por 10000 nacidos vivos) Cali y Restrepo (260 casos por 10000 nacidos vivos), respectivamente.

13. SALUD MENTAL

➤ **Violencia de género e intrafamiliar**

Hasta la semana epidemiológica 37 de 2020, se notificaron 8.391 personas agredidas por violencia de género con procedencia Valle del Cauca, promedio de 227 casos semanales.


Gráfico 1. Violencia de género e intrafamiliar, Valle del Cauca, semana epidemiológica 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

El 80,22% de las personas agredidas son mujeres, 54,7% de ellas se encuentran entre 10 y 29 años; observándose que a excepción del grupo de menores de un año, en todos los grupos de edad son ellas las más afectadas.


Gráfico 2. Violencia de género e intrafamiliar por sexo y edad, Valle del Cauca, semana epidemiológica 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2019.

La violencia más frecuente es la física, tanto en mujeres (62%) como en hombres (63%). La violencia sexual es más frecuente en las mujeres (28% versus 18% en hombres) y la negligencia más frecuente en los hombres (15% versus 3% en mujeres).

Gráfico 3. Violencia de género e intrafamiliar por tipo de violencia y sexo, Valle del Cauca, semana epidemiológica 1-37, 2020.




Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

➤ **Intento de Suicidio**

Hasta la semana epidemiológica 37, se han notificado 1.642 casos de intento de suicidio con procedencia Valle, un promedio de 44,4 casos semanales y una disminución de 20,5% con relación al mismo periodo del año 2019.


Gráfico 4. Intento de suicidio, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020

Un 57,4% de los casos ocurrieron en personas de 15 a 29 años y 64,0% en mujeres.


Gráfico 5. Intento de suicidio por edad y sexo, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

El 62,5% de los casos ocurren por intoxicación, 70,1% de estos en mujeres; el 26,9% por arma cortopunzante. El ahorcamiento es más frecuente en los hombres (61,2%), el lanzamiento de vehículo (53,3%) y también las armas de fuego (83,3%).


Gráfico 6. Intento de suicidio por mecanismo y sexo, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020

El desencadenante más frecuente son los problemas de pareja (36,7%), afectando mucho más a las mujeres (66%), los problemas legales afectan mucho más a los hombres (81%); también los problemas laborales (55%).

Gráfico 7. Intento de suicidio por desencadenante y sexo, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020




Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

14. FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL

➤ **Intoxicaciones por sustancias químicas**

Hasta la semana epidemiológica 37, se han notificado 897 casos de intoxicaciones por sustancias químicas con procedencia Valle, un promedio de 24 casos semanales y una disminución del 47% con relación al mismo periodo del año 2019.


Gráfico 1. Intoxicación por sustancias químicas, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

El 59% de las intoxicaciones ocurren en hombres. El 38% por intoxicación con psicoactivos, siendo estas mucho más frecuentes en hombres (68,7%), mientras los medicamentos son más frecuentes en las mujeres (53%).


Gráfico 2. Intoxicación por sustancias químicas por sustancia y sexo, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020.



Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

El 62% de los casos ocurren en el hogar. El 22% en vía pública, el 72% de estos últimos casos ocurren en hombres.

Gráfico 3. Intoxicación por sustancias químicas por lugar de exposición y sexo, Valle del Cauca, semana 1-37, 2020




Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020

15. POBLACIONES ESPECIALES

Para la semana 37 se realizó un análisis teniendo en cuenta los aspectos relevantes de las poblaciones especiales: Indígenas, militares, policía, migrantes, cárceles. Cada evento tiene una depuración particular, generalmente, se quitan otros departamentos, ajuste 6 y D.

Eventos relevantes para poblaciones especiales a SE 37. Los eventos más relevantes según su incremento en los casos, son IRA por nuevo virus en el grupo carcelario, FFMM y migrantes.

Gráfica 1. Número de casos eventos en salud pública poblaciones especiales, Valle del Cauca, semana 35 2020.



Método análisis epidemiológico software Epidat 3.1 para observación de agrupaciones

Se analizó de acuerdo a la semana en curso y los casos observados para el evento parotiditis y el grupo especial carcelario. Aunque el canal endémico para parotiditis está en zona de seguridad, el sistema de alarma (CUSUM) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) software Epidat 3.1, indicó que hay semanas donde se pueden estar presentando una mayor incidencia en el número de casos de parotiditis en los centros penitenciarios.

Los resultados indican un nivel de estabilidad en la semana 30 y 37, se mantiene la atención en situación de brotes de parotiditis en grupos carcelarios.

Método : Cusum

Tipo de período: Semanas

Cusum inicial : 0

Nº esperado de casos por Semanas: 0,01

| Semana | Observados | Cusum |
|---------|------------|-------------|
| 11-2020 | 2 | 1,00 |
| 12-2020 | 6 | 6,00 Alarma |
| 14-2020 | 1 | 0,00 |
| 15-2020 | 1 | 0,00 |

| | | | |
|---------|----|-------|--------|
| 16-2020 | 8 | 7,00 | Alarma |
| 17-2020 | 4 | 3,00 | Alarma |
| 18-2020 | 3 | 2,00 | Alarma |
| 20-2020 | 17 | 16,00 | Alarma |
| 21-2020 | 2 | 1,00 | |
| 22-2020 | 9 | 9,00 | Alarma |
| 23-2020 | 16 | 15,00 | Alarma |
| 24-2020 | 10 | 9,00 | Alarma |
| 25-2020 | 11 | 10,00 | Alarma |
| 26-2020 | 15 | 14,00 | Alarma |
| 27-2020 | 6 | 5,00 | Alarma |
| 28-2020 | 8 | 7,00 | Alarma |
| 29-2020 | 5 | 4,00 | Alarma |

Fuente: SIVIGILA, Secretaria Departamental de Salud del Valle, Colombia 2020.

TABLERO DE MANDO

Dar click en la imagen para acceder al tablero de mando.



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO VALLE DEL CAUCA

2020



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Secretaría de Salud

María Cristina Lesmes Duque

Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca

Luisa Fernanda Reina González

Subsecretaria Técnica Salud Pública

Hector Andres Betancur Cano

Coordinador Vigilancia en Salud Pública Departamental

Luz Natalia Espinosa Moya

Coordinadora Laboratorio de Salud Pública Departamental

Helmer de Jesus Zapata Ossa

Coordinador Comité Departamental de Estadísticas Vitales

RESPONSABLES DE INFORME

Alba Lucía Rodríguez Niampira, Enfermera Magíster en Epidemiología.

Diana Carolina Pineda Valencia, Enfermera- Especialista en Epidemiología.

Diana Marcela Hoyos Ocampo, Ingeniería Informática Magister Epidemiología

Lilian Beltran, Fisioterapeuta Mg. Epidemiología

Freddy Córdoba, Biólogo Entomólogo especialista en Epidemiología.

Giovanna Andrea Torres. Ingeniera de Sistemas.

Jobany Castro, Químico Farmacéutico, Mg. Epidemiología

Juan Carlos Gutiérrez Millán. Estadístico.

Julián Andrés Peláez Freire, Fisioterapeuta Magister en Epidemiología.

Leidy Johanna Hurtado Bermudez, Estadística, Mg. Epidemiología

Sara Marmolejo, Nutricionista Dietista.

Viviana Alejandra Ortiz Ortega, Psicóloga, Magister en Epidemiología.

Víctor Hugo Muñoz Villa, Psicólogo, Magíster en Epidemiología.

Yanira Mosquera, Enfermera, Especialista en Gerencia Servicios.

EQUIPO DE APOYO

Guillermo Llanos Ramos. Técnico

Mario Suárez Toledo. Biólogo Entomólogo, Magister en Microbiología.

Rafael Antonio Restrepo. Ingeniero de Sistemas, Esp. Gerencia Est. Informática

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

DANE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA



MINSALUD



@SECSALUDVALLE



/SECSALUDVALLE



@SECSALUDVALLE